

ich genauere Daten einsammeln en ich bitte daher einen Jeden, der Naheres uber das Vorkommen der Feldgrille — fruher en jetzt — wei, mir Auskunft daruber zu erteilen.

### Zusammenfassung

Die Verbreitung der Feldgrille in den Niederlanden bis 1958 wurde dargestellt en ein moglicher Zusammenhang zwischen der Nordgrenze dieser Art en der Warmesumme wurde dargelegt. Anlalich eines etwaigen rezenten starken Ruckganges werden neue Verbreitungsdaten eingesammelt.

### Summary

The distribution of the fieldcricket in the Netherlands till 1958 is discussed; a relation between the northern boundary of this species en the accumulated quantity of heat available during the season of activity appears to hold. Because of a suspected recent decrease new data on the distribution are being collected.

### Literatur

- ALLEE, W. C., c.s., 1949, Principles of animal ecology. Philadelphia & London.  
 BODEMHEIMER, F. S., 1926, Uber die Voraussage der Generationenzahl von Insekten. *Z. ang. Ent.* 12 : 91—122.  
 MAANDELIJKS OVERZICHT der weersgesteldheid in Nederland. Koninklijk Meteorologisch Instituut, De Bilt.  
 MERRIAM, C. H., 1894, Laws of temperature control of the geographic distribution of terrestrial animals en plants. *Nat. geogr. Mag.* 6 : 229—238.  
 RAGGE, D. E., 1965, Grasshoppers, crickets en cockroaches of the British Isles. London & New York.  
 ROBER, H., 1951, Die Dermapteren en Orthopteren Westfalens in okologischer Betrachtung. *Abb. Landesmuseum Munster* 14 : 1—60.  
 TISCHLER, W., 1949, Grundzuge der terrestrischen Tierokologie, Braunschweig.  
 WILLEMSE, C., 1917, Orthoptera neerlandica. *Tijdschr. Ent.* 60 : 1—176.  
 ———, 1939, Faunistische lijst van in Nederland voorkomende Orthopteren, Oude-water.  
 ZACHER, F., 1917, Die Geradflugler Deutschlands en ihre Verbreitung, Jena.  
 ZWOLFER, W., 1955, Die Temperaturabhangigkeit der Entwicklung der Nonne (*Lymantria monacha* L.) en ihre bevolkerungswissenschaftliche Auswertung. *Z. ang. Ent.* 21 : 333—384.

---

Vangst van *Drymonia melagona* Bkh. (Lep., Notodontidae). Op 30.VI.1968 ving ik op licht te Epen (Z.-L.) aan de rand van het Bovenste Bos een mannelijk exemplaar van *Drymonia melagona* Bkh. Voor zover bekend is dit het eerste exemplaar, dat in Nederland gevangen is. De soort is vermeld van Aken en de Ardennen, waar de rups voorkomt op beuken en eiken. Dit zou er op kunnen wijzen, dat ook het Zuidlimburgse bosgebied tot het areaal behoort. KOCH geeft overigens in „Wir Bestimmen Schmetterlinge“ 2 op, dat de vlinder in Duitsland zeer lokaal en zeer zeldzaam is.

H. W. VAN DER WOLF, de Stoutheuvel 66, Eindhoven.