

closely related *T. reuteri*". Intussen bleek mij, dat ook *T. simulans* in Nederland voorkomt, maar deze soort ontwikkelt zich uit stromend water. Daarover zal elders worden gerapporteerd. De bevestiging van mijn vermoeden, dat *T. reuteri* ook in het brakke water van Nederland leeft, zal door de vondst van mannetjes geleverd moeten worden.

De lichtvangsten te Melissant en te Middelharnis uitgevoerd tonen aan, dat de soortensamenstelling in het kleigebied van Overflakkee afwijkt van die in het duingebied van Goeree. Van de 23 soorten zijn tot heden 8 alleen in het kleigebied gevonden, terwijl 5 soorten alleen in de duinen zijn aangetroffen. De overige 10 soorten komen in beide gebieden voor. Het is te voorzien, dat bij voortgezet onderzoek deze scheiding voor de bestaande duin-soorten enerzijds en de klei-soorten anderzijds zich zal wijzigen, maar toch is een kern van oligotrofe duinwaterinsekten en polytrofe brakwatersoorten in het kleiland te verwachten. De tijd zal leren, welke soorten wij hiertoe uiteindelijk zullen moeten rekenen.

### Summary

In 1968 important additional material on Neuropteroid insects was collected mostly in lighttraps in the island of Goeree-Overflakkee in the south-western parts of Holland. New records are: 2 Ephemeroptera, 4 Odonata, 4 Neuroptera and 10 Trichoptera. Among the last a species of *Triaenodes* proved to be new for the Netherlands fauna, probably belonging to *T. reuteri* McL., but only females were at hand.

### Genoemde literatuur

1. BRINDLE, A., 1966. The larva of *Triaenodes reuteri* McLachlan (Trichoptera, Leptoceridae). *Ent. Rec.* 78 : 130—133, Fig. 1—5.
2. KIMMINS, D. E., 1964. *Triaenodes simulans* Tjeder in Britain (Trichoptera, Leptoceridae). *Entomologist* 97 : 40—44, Fig. 1—11.
3. MCLACHLAN, R., 1874-1880. A monographic Revision and synopsis of the Trichoptera of the European Fauna, London.
4. PELHAM-CLINTON, E. C., 1966. *Triaenodes reuteri* McLachlan, a species to be restored to the British list; and a redescription of *T. simulans* Tjeder (Trichoptera, Leptoceridae). *Entomologist* 99 : 47—50, Fig. 1—5.

*Nymphalis antiopa* L. op Schouwen (Lep., Nymphalidae). De rouwmantel wordt maar heel zelden in het westen van het land waargenomen en is in dit gebied stellig niet inheems. De schaarse meldingen betreffen altijd ver van hun biotoop afgedwaalde zwerfers. Het lijkt me niet onmogelijk, dat zo een dier zijn tocht nog verder westwaarts voortzet en zo in Engeland terecht komt, hoewel de lepidopterologen daar van mening zijn, dat hun zeer zeldzame immigranten uit Scandinavië afkomstig zijn.

De heer J. P. C. BOOT te Haamstede schreef me, dat 31 augustus 1968 een *antiopa* in het duingebied van Schouwen tussen Haamstede en Westenschouwen gezien was, wat voor dit gebied wel iets zeer bijzonders is. — LPK.