

595.706492

E61
Ent

3-

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING

Deel 29

1 oktober 1969

No. 10

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010 — Nederland

INHOUD: F. J. van Oosterhout: *Archiearis notha* Hübner in Nederland (Lep. Geometridae) (p. 181). — H. Patzak: *Coleophora prunifoliae* Doets und *Coleophora varii* spec. nov. (Lepidoptera, Coleophoridae) (p. 182). — Elisabeth van den Broek: Siphonaptera van Noord-Beveland (p. 188). — N. Nieser: *Donnés faunistiques de Hétéroptères aquatiques IV* (p. 190). — M. J. Gijswijt: Dutch Chalcids VII (p. 193). — Literatuur (p. 200: B. J. Lempke). — Korte mededelingen (p. 187: B. J. Lempke; p. 200: Afdeling Zuid-Holland).

Archiearis notha Hübner in Nederland (Lep. Geometridae)

door

F. J. VAN OOSTERHOUT

Onwetend heb ik zes jaar lang een exemplaar van *Archiearis notha* in mijn verzameling gehad. Het werd 7 april 1963 in de omgeving van Gulpen gevangen, maar verdween onopvallend tussen de serie van *A. parthenias* L. In het najaar van 1968 bij een herindeling van enkele laden viel mij het exemplaar pas op. In het voorjaar van 1969 lette ik natuurlijk extra op de soort. Op dezelfde plaats ving ik nu op 5 en 6 april respectievelijk één en vier exemplaren.

Door de vangst in 1963 en zes jaar later in 1969 mogen we wel aannemen, dat *Archiearis notha*, die daarvoor nog nooit in Nederland was waargenomen, hier te lande wel degelijk inheems is.

De soort is kleiner dan *parthenias*. De mannetjes zijn onmiddellijk te herkennen aan hun gekamde sprieten (bij *parthenias* draadvormig), terwijl de wijfjes op de voorvleugels voor het midden een brede schuin lopende donkere band hebben.

De rups leeft niet op berk, maar op populieren en wilgen.

Summary

The writer mentions the discovery of *Archiearis notha* Hübner in the south of Netherlands Limburg. The species is new to the fauna of the Netherlands.

Gulpen, Prins Bernhardstraat 15.

