

veröffentlicht; auch er kommt zu der Schlußfolgerung, daß *semele* und *aristaens* zwei gute Arten darstellen, nicht nur auf Grund der konstanten Unterschiede des männlichen Genitalapparates³⁾, sondern auch weil die beiden Arten zwar im selben Gebiet fliegen (Etna!) aber sich nicht untereinander kreuzen. Er betrachtet *H. semele* und *H. aristaens* als „sympatrische Arten“.

Auf Elba ist nur *H. aristaens* beobachtet worden; sie ist an vielen Stellen nicht selten.

Hipparchia neomiris Godart (l.c. IV; 314). Diese von Korsika, Sardinien und Elba bekannte Art wird von der letztgenannten Insel als sehr häufig auf dem M. Capanne (von Marciana aufwärts bis zum Gipfel) erwähnt. Die Flugzeit wird mit dem Monat Juli angegeben. Ich erbeutete ein frischgeschlüpftes Exemplar am Gipfel des M. Capanne; offenbar was es eines der ersten Stücke der einzigen Generation.

SOMMARIO

Elenco di qualche farfalle diurne raccolte dall'autore nell'isola d'Elba nell'ultima settimana di giugno 1968.

Coenonympha corinna elbana abundantissima al M. Capanne (m. 1019) e qualche altre località; i due sessi furono raccolti. La ssp. *elbana* si distingue dai punti neri sul disopra delle ali posteriori e la loro variazione viene descritta.

Bennebroek (Niederlande), van Ittersumlaan 32.

³⁾ *H. aristaens* wird gekennzeichnet durch stark gewölbtes Tegumendach; Uncus verdickt, Subunci kürzer als bei *semele*; Processus inferior kräftig entwickelt, flach dreieckig; Aedoeagus kontinuierlich gebogen, gegen die Basis kräftig erweitert; Coccum eingeschnürt.

Antichloris eriphia Fabricius (Lep., Ctenuchidae). In *Ent. Ber.* 28: 162, 1968, vermeldde Asselbergs enkele in ons land aangetroffen adventieven. Hierbij was een exemplaar van *Antichloris eriphia* Fabricius, gekweekt uit een spinsel, dat vastgehecht zat op een banaan. De vlinder hoort thuis in Zuid-Amerika en is verwant aan onze *Amata phegea* L.

In augustus 1967 ving de heer VRANKEN een exemplaar van deze soort tegen een verlichte etalageruit te Echt. In 1968 kreeg hij op dezelfde plaats en onder dezelfde omstandigheden weer een exemplaar te pakken. In de onmiddellijke nabijheid van de vindplaats is een groentehandel gevestigd.

A. W. P. MAASSEN, Julianastraat 2, Montfort (Lb.).

Spialia sertoria Hoffmansegg (Lep., HesperIIDae). Bij het overprikken van de collectie-FRANSSSEN (Natuurhist. Museum, Maastricht) in nieuwe dozen vond ik tussen zijn kleine serie van *Pyrgus malvae* L. een exemplaar van *Spialia sertoria* Hoffmansegg, gevangen te Maalbroek bij Roermond op 9.VI.1919. Van dezelfde vindplaats en datum bevinden zich enkele exemplaren van *Pyrgus malvae* L. in de verzameling.

Van *sertoria* zijn slechts weinige vindplaatsen buiten het Krijtdistrict bekend, ongetwijfeld afkomstig van zwervers (Cat. LEMPKE, 1ste supplement).

A. W. P. MAASSEN, Julianastraat 2, Montfort (Lb.).