

heet (STAUDINGER & REBEL Catalogus 1901, no. 4071). De soort heeft tot synoniem: *Euspilapteryx aurogutella* Stephens, 1835 (BRADLEY, 1967: 45—47).

Aanvulling voor het ter perse gaan: als een bijzondere verrassing, die mijn vertrouwen in de Heer HEYLAERTS geheel bevestigt, komt het nieuws dat de Heer VAN AARTSEN een exemplaar van *Grapholitha lathyрана* Hb., een ♀, op I.VI.1966 te Putten-Gdl. heeft buitgemaakt.

### Summary

Notes on Dutch Microlepidoptera. Four species are new to the Dutch fauna: *Olindia schumacherana* Fabricius, *Grapholitha lathyрана* Hübner, *Pammene gallicolana* Zeller and *Pammene trauniana* Denis & Schiffermüller.

### Literatuur

- BRADLEY, J. D., 1966, Some changes in the nomenclature of British Lepidoptera. Part 4. *Ent. Gazette* 17: 213—235.  
 ———, 1967, Idem. Part 5. *Idid.* 18: 45—47.  
 ———, 1967, Idem. Part 7. *Idid.* 18: 153—154.  
 HANNEMANN, H. J., 1961, Die Wickler (s. str.) (Tortricidae), in DAHL, Die Tierwelt Deutschlands 48, Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. I-XI, 1—233, 466 fig., 22 platen.  
 HODGES, R. W., 1967, The trivial name of the potato tube worm. *Proc. ent. Soc. Washington* 69: 52.  
 OBRAZTSOV, N. R., 1960, Die Gattungen der palaearktischen Tortricidae. II. Die Unterfamilie Olethreutinae. 3. Teil. *Tijdschr. Entom.* 103: 111—143, fig. 64—106, pl. 11—13.

## Kweek van Hymenoptera-Aculeata, voorjaar 1967

door

Br. VIRGILIUS LEFEBER

Evenals de twee voorgaande winters heb ik me ook in de winter 1966—1967 druk bezig gehouden met het verzamelen van dood hout en plantestengels, maar deze keer ook van lege wijngaard-slakkehuisjes en in enkele gevallen van bodemonsters. Dit materiaal heeft 46 Aculeata-species opgeleverd. Ik zal me deze keer beperken tot de soorten, die ik voordien nog niet had uitgekweekt, tot enkele (blijkbaar toch niet zó) zeldzame soorten en tot soorten, die in verrassend groot aantal gekweekt werden:

*Rhopalum clavipes* L.: een ♂ en twee ♀♀; St. Pietersberg; *Viburnum*-stengels.

*Ectemnius lapidarius* Pnz.: drie ♂♂ en een ♀; St. Pietersberg; weipaal.

*Crossocerus elongatulus* Lind.: een ♀; Jekerdal; vlierstengel.

*Crossocerus congener* Dhlb.: een ♂ en een ♀; (Ternaaien) en St. Pietersberg; (wilg) en meidoornhout.

*Crossocerus ambiguus* Dhlb.: 23 ♂♂ en 17 ♀♀; St. Pietersberg; meidoornhout en weipaal.

*Crossocerus podagricus* Lind.: een ♂ en acht ♀♀; (Ternaaien) en St. Pietersberg; (wilg) en meidoornhout.

*Crossocerus capitosus* Sh.: 21 ♂♂ en 12 ♀♀; St. Pietersberg en Kannerbos; es-, vlier- en *Viburnum*-stengels en meidoornhout.

*Crossocerus pubescens* Pnz.: een ♂ en twee ♀♀; St. Pietersberg; weipaal, meidoorn en boomstronk.

*Stigmus pendulus* Pnz.: 80 ♂♂ en negen ♀♀!!; St. Pietersberg; weipaaltjes, meidoornhout en boomstronk. Daarentegen:

*Stigmus solskyi* Mor.: tien ♂♂ en vier ♀♀; idem.

*Psenulus schencki* T.: vier ♀♀; St. Pietersberg en Kannerbos; es en *Viburnum*.

*Psenulus pallipes* Pnz.: een ♂ en vier ♀♀; St. Pietersberg; vlier.

*Passaloecus monilicornis* Dhlb.: vier ♂♂ en drie ♀♀; St. Pietersberg; paal en meidoorn.

*Spilomena troglodytes* Lind.: 28 ♂♂ en 18 ♀♀; St. Pietersberg en Amby; weipaal en meidoorn.

*Pemphredon rugifer* Dhlb.: drie ♂♂; St. Pietersberg en Kannerbos; weipaal en meidoorn.

*Pemphredon clypealis* Thms.: een ♂; Z.-Limburg; 25.IV.1967 tegen raam van kweeklokaal.

*Anthophora acervorum* L.: drie ♀♀; Amby; gedeelte van steile lösswand.

*Melecta punctata* F.: een ♂; idem.

*Osmia aurulenta* Pnz.: 14 ♂♂ en zes ♀♀; Kolmont; wijngaardslak.

*Osmia spinulosa* K.: drie ♂♂ en twee ♀♀; idem.

*Osmia rufa* L.: vijf ♂♂; St. Pietersberg; weipaal.

*Osmia uncinata* Gerst.: drie ♀♀; Kolmont; weipaal.

*Megachile alpicola* Alfk.: twee ♀♀; St. Pietersberg; weipaal.

*Eriades florissomnis* L.: een ♂; St. Pietersberg; weipaal.

*Coelioxys inermis* K.: een ♀; idem.

*Prosopis communis* Nyl.: vier ♂♂ en twee ♀♀; Jekerdal; vlierstengels.

*Prosopis confusa* Nyl.: twee ♂♂; Kolmont en St. Pietersberg; paal en boomstronk.

*Odynerus sinuatissimus* Rich.: een ♀♂; Amby; weipaal.

*Omalus violaceus* Sc.: twee exx.; St. Pietersberg; weipaal en *Sorbus*-stam. Bovendien kweekte de heer A. TEUNISSEN nog twee exemplaren uit een paal te Waalre.

*Sapyga clavicornis* L.: een ♀; St. Pietersberg; weipaal.

### Summary

List of Hymenoptera-Aculeata, bred in the spring of 1967 from dead wood, stems of plants and snail-shells, for the greater part collected in the south of Dutch Limburg. A few Belgian data between brackets.

Maastricht, Brusselsestraat 38.