

BESSELING was een trouw bezoeker van onze vergaderingen. Met zijn vriendelijk karakter stond hij open voor iedereen, die hem over de watermijten wilde raadplegen. Met grote toewijding determineerde hij het materiaal, dat hem van verschillende zijden werd toegezonden en altijd waren zijn antwoorden nauwgezet en gedetailleerd. Het wegvallen van zijn grote kennis en ervaring betekent voor de studie der Hydrachnellae een groot verlies.

G. L. VAN EYNDHOVEN.

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21.

Drie in Nederland aangetroffen adventieven (Lepidoptera)

door

J. E. F. ASSELBERGS

1. *Theretra japonica* Orza (Sphingidae). In oktober 1967 ontving ik een fraai exemplaar van deze pijlstaart, dat in de haven van Rotterdam in een Chinese vrachtvaarder was aangetroffen. Het is een raadsel hoe deze snelle vlieger in zo'n perfecte staat het andere einde van de aarde heeft kunnen bereiken. Volgens JORDAN (in „SEITZ" 2 : 259, 1912) hoort hij thuis in Japan, het Amoergebied, Korea, Formosa en China tot de Yang-Tse-Kiang, terwijl SEITZ zelf in vol. 10 : 567 (1929) meedeelt, dat de vlinder ook ten zuiden van deze rivier voorkomt.

2. *Antichloris eriphia* Fabricius (Ctenuchidae). Op 11 september 1966 maakte ons medelid de heer P. VAN KALMTHOUT mij attent op een donsacht geel spinsel, dat vastgehecht zat op een der bananen, die bij hem thuis in de fruitschaal lagen. Nadat ik gezien had, dat dit spinsel een roodbruine pop bevatte, nam ik het geheel mee naar huis, daar ik vermoedde met een adventief te doen te hebben.

Na 11 dagen kwam een vlinder te voorschijn, die mij onbekend was. Het leek me duidelijk een verwant van onze *Amatis phegea* L., een vertegenwoordiger dus van de Ctenuchidae (vroeger Amatidae), een familie, die in Zuid-Amerika zijn grootste verbreiding heeft. Ook deze „bananenvlinder" hoort tot een soort, die in dat deel van de wereld thuis hoort en daar zeer verbreid is.

De vleugelvorm komt overeen met onze inlandse soort, maar de witte vlekken ontbreken en ook de antennen van het ♀ zijn gekamd.

3. *Lagoptera magica* Hübner (Noctuidae). In oktober 1966 bracht men mij een *Catocala*-achtige uil, die weer aangetroffen was op een vrachtschip in de Rotterdamse haven. Bij navraag bleek, dat het schip vermoedelijk uit Pakistan of India kwam.

De Sphingide en de Noctuide werden in het Zoölogisch Museum (Afdeling Entomologie) te Amsterdam gedetermineerd, terwijl de Ctenuchide door de heer F. DANIEL te München (Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates) op naam werd gebracht.

Ten slotte dank ik de heer J. HUISENGA voor de uitstekende foto's, die hij voor mij van de drie exemplaren vervaardigde en die hierbij afgedrukt zijn.

Summary

Three species of Lepidoptera are mentioned which were incidentally introduced into the Netherlands, viz.:



1



2



3

J. HUISENGA

1. *Theretra japonica* Orza. 2. *Antichloris eriphia* Fabricius. 3. *Lagoptera magica* Hübner.

1. *Theretra japonica* Orza, a Spingid met with in a Chinese cargo vessel in the harbour of Rotterdam.

2. *Antichloris eriphia* Fabricius, a Ctenuchid the cocoon of which was found attached to a banana.

3. *Lagoptera magica* Hübner, a Noctuid from South-east Asia and found in a cargo vessel from Pakistan or India, again in the harbour of Rotterdam.

Bergen op Zoom, Moeregrebstraat 10.

INSTITUUT NOV 5 1968