

GAULLE (1908, in SÉGUY, 1934, p. 361) mentions *Amblynotus* (= *Melanips*) *longitarsis* Reinh. reared on *Leucopis griseola* (Fallén) in France and WILSON (1938) reared the same parasite on *Leucopis obscura* (Hal.) preying on Chermesidae of coniferous trees in England. The Dutch *Melanips* specimens reared on *Leucopis* are certainly not *M. longitarsis*, especially because the parapsidal furrows are complete and distinct and the antennae are not thickened towards the apex. Also some other characteristics do not correspond with the description given by KIEFFER (1902).

I myself reared an unknown *Melanips* species on *Leucopis* sp., preying on apple aphids in Nova Scotia, Canada (EVENHUIS, 1961).

Till now the known hosts of *Melanips* are aphidophagous Diptera Cyclorapha, either Syrphidae as hosts for *M. opacus* or *Leucopis* spp. as hosts for the other species.

#### References

- DALLA TORRE, C. G. DE & J. J. KIEFFER, 1910, Cynipidae. Das Tierreich, 24. Lief.  
 EVENHUIS, H. H., 1961, Some notes on the Dipterous enemies of aphids harmful for apple growing in Nova Scotia. *Canad. Ent.* 93 : 1020—1021.  
 ———, 1965, The economic significance of parasitic Cynipoidae associated with apple in the Netherlands. *Proc. 12 Int. Congr. Ent.*, London, 1964 : 359.  
 ———, 1966, Syrphid predators of apple aphids and their parasites. Ecology of aphidophagous Insects, *Proc. Symp. Liblice near Prague, 1965* : 191—193.  
 KIEFFER, J. J., 1902, Les Cynipides. Spécies des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie.  
 SÉGUY, É., 1934, Diptères (Brachycères) (Muscidae acalypterae et Scatophagidae). Faune de France, 28.  
 SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S. C., 1869, Nieuwe naamlijst van Nederlandsche vliesvleugelige insecten (Hymenoptera). *Tijdschr. Ent.* 12 : 89—118.  
 WILSON, F., 1938, Notes on the insect enemies of *Chermes* with particular reference to *Pineus pini* Koch, and *P. strobi*, Hartig. *Bull. ent. Res.* 29 : 373—389.

Vermeldenswaardige vangsten van Lepidoptera en Diptera. Op 24 april 1968 ving ik onder Oirschot een gynandromorf van *Anthocaris cardamines* L., links ♀, rechts ♂. Het was een belevens deze vlinder, die met zijn ene oranje vleugeltip natuurlijk onmiddellijk opviel, te kunnen bemachtigen.

Enkele minder gewone zweefvliegen, die ik in 1966 en 1967 ving, zijn de volgende:

*Leucozona lucorum* L. Oirschot, 20.V.1967.

*Pipiza austriaca* Mg. Oirschot, 24.VIII.1967.

*Pipiza lugubris* Fabr. Nederwetten, 30.VI.1967.

*Syrphus triangulifer* Zett. Nuenen, 4.VII.1967.

*Cheilosia intonsa* Loew. Bergen op Zoom, 1.IX.1967.

*Cheilosia lenis* Beck. Vaals, 5.V.1967.

*Parapenium flavitarsis* Mg. Oirschot, 1.VII.1967.

*Xylota tarda* Mg. Best, 20.VI.1967. Ter plaatse niet zeldzaam.

*Eristalis jugorum* Egg. Brunssum, 10.IX.1966. Het tweede exemplaar voor Nederland.

*Parbelophilus frutetorum* Fabr. Schaesberg, 26.VI.1966. Gevangen door de heer L. H. CLAASSENS te Heerlen.

De heer V. S. VAN DER GOOT was zo vriendelijk in twijfelgevallen de determinatie te verrichten of te controleren.

W. VERHAAK, Boschdijk 1004, Eindhoven.