

6,5—10,5 m te vinden is. De literatuur vermeldt maar tweemaal eerder een vindplaats in de diepte, nl. op 14 m in een meer in Lettland (OZOLINS, 1930a) en op 9 m diepte in een meer in midden-Zweden (LUNDBLAD, 1962).

De vier vangsten E leverden van de f. *imminuta* in totaal 3 ♂ en 34 ♀. De februari-vangst hiervan leverde 3 ♂ en 27 ♀. Blijven over voor de drie andere vangsten 7 ♀. De 17 vangsten F leverden in totaal 19 ♀. Gemiddeld wordt dit dus per vangst 1—2 adulti. Alleen bovengenoemde februari-vangst is een uitschieter. Waaraan dit resultaat te danken is, is niet te zeggen. De vangsten leveren wel het bewijs dat de verdeling zeer ongelijk kan zijn. Een eidragend ♀ werd tweemaal ontmoet in een F-vangst in mei.

Drs. PARMA schrijft: „Het dierlijk leven is op de bodem niet rijk. Voornamelijk worden aangetroffen larven van de mug *Chaoborus*, enkele Chironomiden-larven en Oligochaeten.” Het zullen wel deze dieren zijn, waarvan de mijt leeft.

P. coccinea parasiteert op Chironomiden. Indien er bij de f. *imminuta* een parasitaire faze is, lijkt het waarschijnlijk dat het parasitisme geschiedt op de Chironomidenlarven die worden aangetroffen. De imagines zullen wel voor de verspreiding zorgen.

Ten slotte dank ik de heer Drs. PARMA voor zijn medewerking.

Zusammenfassung

In einem Teich östlich von Utrecht wurde in einer Tiefe von 6,5 bis 10,5 m die dort lebende Wassermilbe *Piona coccinea* f. *imminuta* Piers., 1897, aufgefunden.

Literatuur

- KOENIKE, F., 1909c, in BRAUER, Süßwasserfauna Deutschlands H 12, II Acarina, Milben: 120.
- LUNDBLAD, O., 1920, Süßwasseracarinen aus Dänemark. *Mém. Ac. Roy. Sc. et des Lettr. de Dan.* 8me sér. 6 (2): 190.
- , 1962, Die Hydracarinen Schwedens II. *Ark. f. Zool.* [2] 14 (1): 148.
- OZOLINS, V., 1930a, Bericht über hydracarinologische Untersuchungen in Lettland. *Fol. Zool. Hydrob.* 1: 267.
- PIERSIG, R., 1897c, Revision der Neuman'schen Hydrachniden-Sammlung des Gotenburger Museums. *Zool. Anz.* 540 u. 541: 337.
- SOAR, C. D., 1907, British Hydrachnidae: The Genus *Piona*. *Trans. Edinb. Field Natur. and Micr. Soc.* 5: 385.
- VIETS, K., 1924h, Die Hydracarinen der norddeutschen, besonders der holsteinischen Seen. *Arch. Hydrob. Suppl.* 4.
- VIETS, K. & K. O. VIETS, 1954d, Die Wassermilben des Bremer Raumes. *Abb. Naturw. Ver. Bremen* 33.

Utrecht 3, Prof. Jordanlaan 66.

Saturnia pavonia L. (Lep., Saturniidae). Poppen die twee maal overwinteren. Op 18 mei 1967 verkreeg ik een mannelijke vlinder, op 20 mei een vrouwelijke en op 2 juni nogmaals een mannelijk ex. uit poppen, afkomstig van een kweek van 1965.

J. P. C. BOOT, Duinwegje 31, Haamstede.