

fangen, sodaß ich nicht daran zweifle, daß wir es hier mit einer guten Subspecies zu tun haben, welke ich subsp. *hispanica* nenne.

Holotype: ♂, Pto. de Navacerrada, Zentralspanien (Prov. Madrid), 1800 m, 30.VI—8.VII.1959, J. R. & W. CARON leg.

Allotype: ♀, selver Fundort und Datum.

Beide Typen befinden sich in der Sammlung-CARON.

Am selven Fundort wurden auch vom 14. bis 19. Juni 1960 eine Anzahl Exemplare gefangen. Ein zweiter Fundort ist Cercedilla Dehesas, 1375 m, in derselben spanischen Provinz, wo Frau und Herr CARON vom 21. bis zum 30. Juni 1960 sammelten.

Exemplare der englischen Nominatform und der neuen Subspecies werden in Fig. 1—7 abgebildet.

HEYDEMANN beschrieb in *Stett. ent. Z.* 103 : 14 (1942) eine bunte Form aus dem Schwarzwalde, welke er *marmorata* nannte. Die spanische Form ist hiermit sicher nicht identisch. Bei der süddeutschen Form sind die Ante- und Postmedianlinie schwarz, bei der spanischen heben sie sich kaum von der Grundfarbe ab. Die drei Vorderflügelmakeln sind bei den Schwarzwäldertieren schwarz umzogen, die spanischen zeigen auch hiervon keine Spur.

---

*Colostygia multistrigaria* Haworth (Lep., Geometridae). Dit zal in de duinstreek wel een gewone soort zijn, want waar ik er naar zocht, vond ik de rupsjes op *Galium*. Ze zijn alleen te vinden vòòr de eerste vervelling. Dan leven ze namelijk aan de uiteinden van de scheuten, maar laten zich al bij een ademtuchtje vallen. Na de eerste vervelling houden ze zich overdag blijkbaar onder de vegetatie op, want ze zijn dan niet meer te vinden. Tegelijk met deze soort vond ik vrij veel rupsen van *Lygris pyraliata* Schiff.

Op dezelfde plaatsen (Wassenaar, Katwijk, Oostvoorne) vond ik de rupsjes van *Notbopteryx polycommata* Schiff. Ook deze zijn het gemakkelijkst te zoeken, wanneer ze pas uit het ei zijn. Ze zijn dan lichtgeel en steken duidelijk af tegen het ligustergroen. Later hebben ze dezelfde kleur en zijn volkomen onbeweeglijk.

M. W. CAMPING, Julianalaan 37, Putten-Gdl.

*Epirrhoe tristata* L. (Lep., Geom.). Ik vind het maar vreemd, dat dit vroeger zo een zeldzame soort was. Het is langzamerhand zo, dat, wanneer ik ergens loop, waar het me uitermate geschikt lijkt voor de soort, ik de vlinder ook vind. Als vindplaatsen herinner ik me: Norg, Fochtelerveen, Bakkeveen (op de heide en vrij ver daarvandaan in een oud beukenbos), Duurswoude, Gortel, Assel, Hoenderlo.

M. W. CAMPING, Julianalaan 37, Putten-Gdl.

*Parastichtis suspecta* Hb. (Lep., Noctuidae). Van deze enigszins lokale en meestal niet gewone soort van de duinen, zandgronden en bosachtige streken ving ik op 15 juli 1964 een exemplaar in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos.

M. P. PEERDEMAN, Westlandgracht 175 II, Amsterdam - Overt. Veld.

**Bestelling.** Alle bestellingen uitsluitend te richten aan de Bibliotheek van de Ned. Ent. Ver., Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. en pas betalen na ontvangst van de nota. Alleen op die manier voorkomt U vertragingen en vergissingen.