

595. 70649J

E 61

Ent.

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 27

1 augustus 1967

No. 8

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: A. W. P. Maassen: Korte notities over enige dagvlinders in Midden-Limburg (p. 141). — D. Doom: Notes on *Gnathotrichus materiarius* (Col. Scolytidae), a timber beetle new to the Netherlands (p. 143). — G. L. van Eyndhoven: The Red Currant Gall Mite, *Cecidophyopsis selachodon* n.sp. (p. 149). — G. J. Flint: Lichtvangsten van Lepidoptera in 1965 bij de Abdij Sion (gem. Diepenveen) (p. 152). — J. C. Downey: Sound-Production in Nederland Lycaenidae (p. 153). — H. van Oorscot: Dagvlinderonderzoek in Midden-Oostenrijk van 23 juli tot 9 augustus 1964 (p. 158). — Literatuur (p. 151: P. J. Brakman). — Korte mededelingen (p. 142: A. W. P. Maassen; p. 157: M. W. Camping, Aangeboden).

Korte notities over enige dagvlinders in Midden-Limburg

door

A. W. P. MAASSEN

Papilio machaon L. Reeds vele jaren een zeldzame soort. In augustus 1966 twee exemplaren te Montfort, één te Maasbracht en één te Beegden; ondanks ijverig zoeken op tal van plaatsen geen rupsen gevonden.

Anthocaris cardamines L. Sterk achteruitgegaan. In 1966 enkele vlinders bij het Laumansven te Herkenbosch. In Zuid-Limburg plaatselijk nog talrijk.


Heodes tityrus Poda. Tot \pm 1960 te Montfort zeer gewoon; daarna nauwelijks meer gezien. In 1966 vrij talrijk op enkele plaatsen te Herkenbosch.

Celastrina argiolus L. Jarenlang weinig gezien; speciaal de tweede generaties in 1965 en 1966 talrijk op diverse plaatsen: Putbroek (Echt), Vlodrop en Herkenbosch.

Maculinea nausithous Bergstr. en *M. teleius* Bergstr. Beide prachtige blauwtjes zijn wel zeer sterk teruggelopen. Op alle mij bekende vliegplaatsen in Maas- en Roerdal heb ik al jaren achter elkaar weinig of niets meer van deze vlinders gezien. Trouwens de *Sanguisorba* is door de kunstmest en intensieve beweiding op de meeste plaatsen practisch uit het weidebestand verdwenen. Het was dan ook een blijde verrassing in 1966 op een klein moerassig weetje, gelegen temidden van dennenbossen op enige km afstand van de Roer, beide soorten in de laatste decade van juli vrij talrijk aan te treffen, waarbij *nausithous* sterk in de meerderheid was; ook enkele exemplaren van *teleius* bij het Laumansven te Herkenbosch gezien.

Plebejus argus L. Al jaren weinig meer gezien. In 1966 op de heide te Vlodrop de soort niet gevonden, in de vijftiger jaren vloog *argus* hier volop.

Cyaniris semiargus von Rott. Dit m.i. zeer zeldzaam blauwtje heb ik nog nooit gevangen!



Polyommatus icarus von Rott. In mijn omgeving stellig niet meer zo'n gewone soort. In 1964 plotseling massaal te Annendaal (Echt). Het jaar daarop weer weinig. In 1966 vrij talrijk te Herkenbosch.

Melitaea cinxia L. Tot 1958 nog vrij talrijk op één plaats te Herkenbosch. Daarna verdwenen. Ook langs het Julianakanaal te Maasbracht etc. heb ik *cinxia* niet meer teruggevonden. In 1965 één exemplaar gevangen te Lomm en één te Montfort.

Mellicta athalia von Rott. Vloog tot \pm 1960 in massale aantallen op diverse plaatsen te Montfort. De laatste jaren nog slechts sporadisch waargenomen. In Belfeld vliegt *athalia* nog steeds talrijk.

Araschnia levana L. Het is weer lang geleden, dat ik het landkaartje in mijn tuin kon vangen! In 1966 vrij talrijk te Herkenbosch en in de „Doort” te Echt, in beide generaties.

Polygonia c. album L. Nog steeds vrij gewoon. In 1966 waargenomen te Montfort, Annendaal, Vlodrop en Herkenbosch.

Nymphalis antiopa L. In 1959 heb ik *antiopa* voor het laatst gezien, daarvoor ook al niet talrijk, maar toch elk jaar wel enkele vlinders te Montfort, Annendaal, Munnicksbosch en Boukoul (Swalmen). In 1956 en 1957 vele exemplaren op bloedende en „gesmeerde” berken in het natuureservaat „Meynweg”.

Nymphalis polychloros L. Tot 1962 een vrij gewone soort te Montfort. In 1961 bv. nog \pm 30 exemplaren. Daarna heb ik de grote vos maar een hoogst enkele keer meer gezien. Men heeft hier de laatste jaren vele oude en verwaarloosde boomgaarden geroid, m.i. toch wel één van de oorzaken van de achteruitgang.

Pararge aegeria L. en *Pyronia tithonus* L. Beide soorten gewoon. In 1966 bepaald talrijk te Vlodrop en Herkenbosch.

Hipparchia semele L. Was hier in de vijftiger jaren zeer gewoon, nu een zeldzaam dier.

Summary

Notes on the occurrence of butterflies in the centre of Dutch Limburg. Many species have become much rarer or late or have even completely disappeared. But a new locality could be discovered for the two *Maculinea* species.

Montfort (L.), Julianastraat 2.

Theria rupicapraria Denis & Schiffermüller (Lep., Geom.). Na jarenlang in mijn woonplaats en omgeving vergeefs gezocht te hebben naar de spanner *Theria rupicapraria*, had ik in januari 1967 onverwacht succes in de tuin van mijn buurman. Men was hier bezig een \pm 100 jaar oude meidoornhaag te rooien. Van 16 tot 21 januari ving ik bij deze heg ongeveer 60 mannetjes, nadat mijn vrouw het eerste exemplaar had opgemerkt tegen een verlicht raam van onze woning. Toen was het afgelopen: de heg verdwenen en de grond omgeploegd. Bij de in deze periode bezochte meidoornhagen te Putbroek, Melick, Odiliënberg en Lerop (bij Roermond) werd *rupicapraria* niet gevonden.

Toch wel even een verrassing, wanneer men een lang vergeefs gezochte soort bij wijze van spreken naast de deur in aantal kan vangen! Alleen maar jammer, dat met de heg deze populatie ook wel verdwenen zal zijn.

A. W. P. MAASSEN, Julianastraat 2, Montfort (Lb.).