

Enkele vangsten van Syrphidae uit de jaren 1960-1965

door

A. VELTMAN

Sinds ik mij in 1960 voor Zweefvliegen begon te interesseren is mijn verzameling verrijkt door een aantal vangsten, die — hoewel sommige ervan dus al vrij „oud” zijn — om de een of andere reden vermelding verdienen.

Chrysotoxum verralli Collin. Twee ♂♂, verzameld te Lochem, 20 en 25.VII.1965.

Chrysotoxum arcuatum L. Een ♂, Lochem, 23.VII.1965.

Chrysotoxum festivum L. Van deze soort ving ik in West-Nederland: Naarden, 24.VI.1961; Huizen-N.H., 7.VI.1962; Amsterdamse Bos, 30.VII.1964, telkens één ♀.

Volucella pellucens L. In het Amsterdamse Bos komt deze soort soms in groot aantal voor, vooral in de bossen ten noorden van de Bosbaan en in de omgeving van het Kinderbadje. Ik ving hier: 12.VI.1963, drie ♂♂ en twee ♀♀; 22.VI.1963, twee ♂♂; 21.VI.1964, een ♂ en een ♀.

Op 29.VI.1965 ving ik in het Amsterdamse Bos een ♀, dat op enkele centimeters van de ingang van het nest van de hommels *Bombus pratorum* L. (met dank aan Dr. G. KRUSEMAN voor de determinatie) op het blad van Brandnetel zat. In Lochem zag ik op 23.VII.1965 een exemplaar letterlijk in de ingang van een wespennest zitten. De wespen negeerden de vlieg volkomen, maar namen tegenover mij een dermate vijandige houding aan, dat ik mijn angst moest laten gaan.

Syrphus grossulariae Meig. Twee ♀♀, Lutterzand, 16.VIII.1963; twee ♀♀, Amsterdamse Bos, 22.IX.1963 en 14.VIII.1965, de laatste een vangst van mijn vijfjarig zoontje! Deze soort is dus zeker niet beperkt tot het zuiden van ons land, maar komt ook noordelijker en westelijker voor. (Vgl. LAMBECK, *Ent. Ber.* 19 : 147 en 21 : 54; VAN DER GOOT & LUCAS, *Ent. Ber.* 24 : 9).

Syrphus lineola Zett. Denekamp, 11.VIII.1963, een ♀; Amsterdamse Bos, 25.VIII.1965, een ♀; 27.VIII.1965, een ♂ en twee ♀♀.

Syrphus umbellatarum F. Amsterdamse Bos, 23.VIII.1965, een ♀.

Syrphus cinctus F. Amsterdamse Bos, 21.VII.1963, twee ♂♂; 17.VII.1964, een ♂; 25.VIII.1965, een ♀; 15.IX.1965, drie ♂♂. Alle ♂♂ werden in de vlucht gevangen, het ♀ werd op koolzaad verzameld.

Cheilosia grossa F. Amsterdamse Bos, 23.IV.1963, twee ♂♂.

Cheilosia impressa Loew. Er werd al rekening gehouden met voorkomen buiten het in de N.J.N.-tabel als „binnenland” aangeduide gebied (VAN DER GOOT & LUCAS, *Ent. Ber.* 24 : 5). Hoewel het Gooi volgens deze tabel tot het binnenland behoort, kan men dit m.i. niet laten gelden voor de moerassen aan de IJselmeerkust, waar ik deze soort ving: Huizen-N.H., 16.VIII.1960, een ♂; 31.VIII.1960, twee ♀♀.

Cheilosia fraterna Meig. Amsterdamse Bos, 6.V.1963, een ♂ en een ♀.

Sphaerophoria rueppellii Wied. Tweemaal ving ik deze soort in de omgeving van Amsterdam: opspuiting bij Sloterdijk, 4.IX.1964, een ♂; Amsterdamse Bos, de Heuvel, 21.VI.1965, een ♀. Beide keren trof ik het dier aan in dezelfde

situatie: laag boven de grond vliegend, nauwelijks zichtbaar, op een terrein dat, op een enkel plantje na, kaal was. Ik kan me voorstellen, dat ook de rand van de heide, waar LUCAS deze soort veel zag (VAN DER GOOT & LUCAS, *Ent. Ber.* 24 : 9), er zo uitzag.

Xanthogramma pedissequum Harr. (*X. ornatum* Meig.) Lochem, tussen 17 en 22.VII.1965, twee ♂♂ en een ♀.

Pyrophaena rosarum F. In het Amsterdamse Bos waren in 1964 zeer grote aantallen van deze soort te zien aan het z.g. Doodlopend Voetpad, een pad met weelderig begroeide berm, dwars door de rietlanden aan het Nieuwe Meer. Ik ving hier deze soort van 14.VI.1964 tot en met 13.IX.1964, zodat we, waar de N.J.N.-tabel als vliegtijd opgeeft: mei—juli van een zeer laat voorkomen kunnen spreken. Ook in 1965 zag ik het dier op genoemde plaats, echter in minder groot aantal en niet zo laat in het jaar.

Ischyrosyrphus laternarius O.F.M. Twee ♀♀: Denekamp, bij Singraven, 11.VIII.1963 en Lutterzand, 16.VIII.1963.

Scaeva (= *Lasioticus*) *pyrastris* L., var. *unicolor* Curt. Een ♀, Lochem, 30.VII.1965.

Triglyphus primus Loew. Amsterdamse Bos, 10.VI.1965, een ♂; Lochem, 22.VII.1965, een ♀. Ik heb op beide vangplaatsen geen *Artemisia* gezien, maar op laatstgenoemde plaats wel opgemerkt, dat de *Epilobium* er grijs zag van de bladluizen (vgl. VAN DER GOOT e.a., *Ent. Ber.* 21 : 66 en VAN DER GOOT & LUCAS, *Ent. Ber.* 24 : 4).


Eristalis pratorum Meig. Een ♂, op 6.VI.1961 te Huizen-N.H., dood gevonden in een vensterbank.

Tubifera hybrida Loew. Van deze soort, die toch niet als algemeen geldt, heb ik de volgende vangsten: Huizen-N.H., 6.V.1961, twee ♀♀; 17.V.1961, een ♂; 7.VI.1961, een ♀; Denekamp, 12.VIII.1963, een ♀; Lochem, 24.VII.1965, twee ♀♀; Amsterdamse Bos, 17.VII.1963, een ♂; 18.IX.1963, een ♀.

Parhelophilus versicolor F. Amsterdamse Bos, een ♂ op 23.VI.1964 en een ♀ op 9.VII.1965.

Eurinomyia lunulata Meig. Huizen-N.H., IJsselmeerkust, 17.VIII.1960, een ♀; 6.V.1961, een ♀; 17.V.1961, een ♀.

Amsterdamse Bos, Doodlopend Voetpad, 12.V.1965, twee ♂♂ en twee ♀♀; 25.V.1965, drie ♂♂; 2.VI.1965, een ♂ en een ♀.



Sphaerophoria rueppellii Wied., ♂

Denekamp, oever van het Kanaal Almelo-Nordhorn, 14.VIII.1963, een ♂.

Op alle vindplaatsen trof ik ook *Eur. lineata* F. aan (vgl. VAN DER GOOT & LUCAS, *Ent. Ber.* 24 : 11).

In Huizen en Denekamp viel mij de voorkeur van beide soorten voor de plant *Mentha aquatica* op.

In Amsterdam is me daarvan niets gebleken. De Watermunt komt op genoemde plaats ook niet veel voor.

Eumerus tuberculatus Rond. Egmond aan Zee, 17.VI.1965, een ♀.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de Heer V. S. VAN DER GOOT te Amsterdam, die zo vriendelijk was mijn determinaties te controleren en, waar nodig, te verbeteren.

Summary

Enumeration of rarer or more local Syrphidae, many of them caught in the immediate vicinity of Amsterdam.

Amsterdam-W. 3, Voorburgstraat 29¹.

Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.) VII¹)

door

G. DEN HOED

NOTITIES BIJ ICHNEUMONINI

4. *Barichneumon* Thoms. incl. *Melanichneumon* Thoms. De vage begrenzing van deze genera is aanleiding geweest tot diverse herschikkingen. Deze variëren van rigoreuze samentrekking binnen één genus tot verdeling in meer genera. De door mij hieronder gebruikte volgorde zou dienstig kunnen zijn bij het opstellen van collecties.

a. *Melanichneumon* Thoms. sec Perkins

Melan. leucocheilus Wesm. komt hier zeer zelden voor. In de verzameling-OUDEMANS bevindt zich een ♀ exemplaar uit Overveen van mei 1878.

Melan. fortipes Wesm. is ook al bijzonder zeldzaam in ons land. In Wageningen in de collectie-SMITS VAN BURGST bevindt zich een ♀ van Breda uit de maand juli.

b. *Bar. peregrinator* L. nec Grav. nec Roman (syn. *Ichn. vacillatorius* Grav.) is in mijn voorlopige soortenlijst vermeld onder het synoniem *Ichn. scriptorius* Thunb. De soort is hier vrij algemeen.

c. *Stenobarichneumon* Heinr. 1961 (genus dan wel subgenus)

Bar. citator Thunb. was met oudere werken niet te determineren. Vindplaatsen: Heeze, Oegstgeest, Hilversum, Amersfoort. Ongetwijfeld zal zich in oudere collecties meer materiaal verschuilen.

Bar. basiglyptus Kriechb. 1890 nec auctt., staat in mijn lijst onder het synoniem

¹) Deze bijdrage behoort systematisch vòòr nr. VIII, die reeds gepubliceerd is in *Ent. Ber.* 25 : 185 (1965).