

Summary

Report of a collecting trip to Northern Italy via Martigny and the Great St. Bernard with a list of the species observed during the journey.

New forms described are:

Mellicta varia H.-S., f. *nigrocingulata*. Under side hind wings: the central band on both sides and along the nervures bordered by thick lines, resulting in a chain of pale spots with black circumscriptions.

Melitaea phoebe Schiff., f. *brunnea*. Markings on upper and under side of the wings brown instead of black.

f. *flavomarginata*. In the black marginal band is in each cell an oblong pale yellow spot, separated from the fringe by a thin black line.

f. *nigromaculata*. Under side hind wings: the basal spots with thick black rings. (Moreover the subterminal and terminal lines are absent. The S-shaped central band on upper and under side of the fore wings also fails)

Mellicta deione Hb.-G., f. *nigrocingulata*. Under side hind wings: in the pale yellow central band a row of black spots with pale centre.

f. *nigrolunulata*. Under side hind wings: the subterminal line broadened in the shape of black semi-lunular spots.

Nymphalis antiopa L., f. *grisescens*. Fore wings thinner scaled, therefore greyer. But the nervures remain of the normal dark colour. The yellow and blue markings strongly powdered with black scales.

Amsterdam-W., Rietwijkerstraat 7 II.

Ichneumonidae gekweekt uit *Bupalus piniarius* L. (Lepidoptera). In de jaren 1962 tot en met 1965 werden uit de Geometride *Bupalus piniarius* L. vele Ichneumonidae gekweekt onder leiding van Prof. H. KLOMP. Ook het ITBON en wel met name de heer H. F. H. BLANKWAARDT heeft zijn bijdrage geleverd. Het materiaal, dat mij ter beschikking werd gesteld, bevatte:

Ichneumoninae — *Coelichneumon auspex* Muell., *Cratichneumon nigritarius* Grav., *Poecilostictus cothurnatus* Grav.;

Campoplegini — *Dusona* (*Campoplex*) *flaviscapa* Thoms. (dicht bij *Dus. oxyacanthae* Boie);

Anomalini — *Gravenborstia* (*Anomalon*) *biguttatum* Grav., *Heteropelma calcator* Wesm. (*xanthopus* Grav.);

Mesochorinae — *Mesochorus politus* Grav. (hyperparasiet!).

Opm. *Dusona* werd uit de larve gekweekt, de andere soorten uit de pop. Aangezien er nog 8 soorten meer als parasiet van deze coniferen-spanner te boek staan, houd ik mij voor kweekresultaten aanbevelen.

G. DEN HOED, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum.

Insekten uit Australisch Nieuw Guinea. Voor hen, die belangstelling hebben voor insekten uit Australisch Nieuw Guinea geef ik hierbij het adres van de heer TH. VERBEEK : c/o DASE, Kokoda N.D., Territory of Papua, New Guinea. Hij is bereid tegen vergoeding aan belangstellenden insektenmateriaal uit dit gebied op te zenden.

J. Ph. VAN DRIEST, Hoogegeest 37, Akersloot.