

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 26

1 september 1966

No. 9

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD : T. H. van Wisselingh : Macrolepidoptera in 1965 (p. 153). — B. van Aartsen : Lepidoptera-vangsten in 1964 (p. 155). — B. van Aartsen : Lepidoptera-vangsten in 1965 (p. 156). — G. A. Bentinck : Mededelingen over Lepidoptera (p. 157). — E. J. E. Lückner : Vangsten van enige zeldzame of minder gewone Lepidoptera uit Midden-Limburg in 1964 en 1965 (p. 158). — E. J. Nieuwenhuis : Lycaenidae van Nieuw-Guinea (p. 160). — J. van der Vecht : Notes on Palaearctic Eumenidae (Hymenoptera) (p. 161). — J. T. Wiebes : Agaonid fig wasp from *Ficus sundaica* (Hymenoptera, Chalcidoidea) (p. 166). — L. H. Claassens : Achteruitgang van de vlinderfauna (p. 170). — Literatuur (p. 159, 172; B. J. Lempke; p. 172; L. G. E. Kalshoven). — Korte mededelingen (p. 154; W. J. Kabos; p. 165; G. den Hoed; P. J. van Helsdingen; p. 171; B. J. Lempke).

Macrolepidoptera in 1965

door

T. H. VAN WISSELINGH

Evenals vorige jaren zal ik ook thans weer een overzicht geven van mijn bevindingen in het vorige jaar aangaande de vangst van Macrolepidoptera. Wat de klimatologische omstandigheden betreft was 1965 het slechtste jaar, dat ik ooit heb meegemaakt. Sinds de waarnemingen in De Bilt zijn begonnen, is er nog nooit zoveel regen gevallen, het aantal uren zonneschijn was ver beneden normaal, evenals de gemiddelde temperatuur. Bovendien was het aantal goede vangavonden zeer gering, zodat zowel de vangst op licht als op smeer zeer slecht was.

Blijkens de getoonde grafiek bedroeg het aantal soorten, dat ik in 1965 waarnam, slechts 338, het laagste aantal dat ik ooit ben tegen gekomen. Het maximum was 481 in 1954 te Aerdenhout, het minimum tot nog toe 400 in 1961 te Bergeijk. Het hoogste aantal soorten op één avond was 75 tegen 86 in 1964 en 124 in 1963 (Bergeijk). (Maximum 128 in 1954 te Epen).

Zeldzame soorten.

Spialia sertoria Hoffmanssegg. Op 7 juni te Cadier en Keer zes exemplaren.

Harpyia bicuspis Borkhausen. Op licht te Epen op 8 juni.

Mythimna sicula Treitschke. Deze soort is in 1952 voor het eerst in ons land aangetroffen en is daarna meerdere malen in enkele exemplaren in de zuidelijke helft van het land gevangen. Op 25 juni kwam een exemplaar op de lamp te Epen.

Mysticoptera sexalata Retzius. Verleden jaar vermeldde ik, dat deze soort, waarvan ik in 1962 tien, in 1963 acht en in 1964 enige exemplaren te Bergeijk op de

lamp kreeg, althans daar niet zeldzaam was. In 1965 ving ik er in juni en juli weer vijf exemplaren.

Oligia versicolor Borkhausen. In mijn collectie stond tussen vele exemplaren van *O. latruncula* Schiff. een exemplaar van *versicolor*, gevangen te Winterswijk op 20.VI.1952.

Afwijkingen.

Op 9.VIII.1965 kwam een sterk afwijkend exemplaar van *Mamestra suasa* Schiff. (*dissimilis* Knoch) op licht. Het dier is effen bruingrijs, de anders scherpe golflijn met duidelijke W is nauwelijks zichtbaar.

Diloba caeruleocephala L., f. *nigrofasciata* nov. Thorax en abdomen zwart, halskraag donker bruinachtig grijs; voorvleugels met zwart middenveld en normaal licht gekleurde vlekken, wortelveld en gewaterde band donker bruinachtig grijs, franjeveld zwartachtig; achtervleugels donker grijs. Epen, ♂, 1.X.1965, holotype.

Vroege datum.

Pieris brassicae L. Deze soort was in 1965 talrijk, zowel in de eerste als in de tweede en in de derde generatie. Het eerste exemplaar ving ik niettegenstaande het slechte weer reeds op 4 april.

Diversen.

Nymphalis polychloros L. Einde juni vond ik 's avonds terwijl ik op licht ving, tegen een kelderdeur van Hotel Het Krijtland te Epen 12 rupsen van deze vroeger algemene maar de laatste jaren veel zeldzamere soort. In de directe omgeving van het hotel staat geen van de voedselplanten. De dichtst bijzijnde kerseboom staat op 60 m afstand op een verhard parkeerterrein. De rupsen moeten derhalve een vrij grote afstand over verhard terrein afgelegd hebben om een gunstige plaats voor de verpopping te vinden.

Aglais urticae L. Vermoedelijk als gevolg van het zeer zachte weer in het einde van januari 1966 nam ik reeds op 1 februari j.l. een exemplaar van deze soort in mijn tuin waar.

Summary

Discussion of more or less rare species of Macrolepidoptera observed in 1965 in the provinces of North Brabant and Dutch Limburg. Owing to the extremely bad weather the number of species and specimens was far below the average.

A new form is described:

Diloba caeruleocephala L., f. *nigrofasciata* nov. Thorax and abdomen black, collar dark brownish grey; fore wings with black central area and normal pale spots, basal and postmedian areas dark brownish-grey, marginal area black; hind wings dark grey.

Bergeijk, Bremdreef 2.

Afdeling Noord-Holland en Utrecht. Voor het seizoen 1966—1967 zijn de vergaderingen vastgesteld op de volgende woensdagavonden: 28 september, 30 november, 25 januari en 8 maart, als altijd om 20 uur in Hotel Krasnapolsky.

Convocaties zullen alleen nog verzonden worden aan degenen, die f 2,— betalen.

W. J. KABOS, Secretaris.