

Lycaenidae van Nieuw-Guinea

door

E. J. NIEUWENHUIS

Op de Wintervergadering van 20 februari 1966 liet ik een collectie Lycaeniden rondgaan, die door ons medelid R. STRAATMAN gedurende 1963 in de Sepikvallei zijn verzameld.

De bronrivieren van de Sepik ontspringen op de grens tussen het voormalige Nederlandse gebied van Nieuw-Guinea en het z.g. Mandated Territory, d.i. het vroegere Duitse deel, dat in 1918 door de Volkenbond aan Australië gemandateerd werd. De rivier stroomt oostwaarts door een brede vallei, die noordelijk, zuidelijk en in het westen door bergen beschermd wordt, dit in tegenstelling tot de meeste andere rivieren in Nieuw-Guinea, die zeewaarts door het vlakke laagland stromen. De indruk is dan ook, dat de vlinderfauna rondom de Sepik rijker is dan elders, bijv. in Hollandia, Merauke, Manokwari of Sorong.

Dit blijkt al dadelijk bij de soorten van het genus *Thysonotis*, waarvan niet minder dan 6 soorten werden gevangen waarvan er één zelfs met behulp van het British Museum (Natural History) niet op naam kon worden gebracht. Elders moet men in het laagland met niet meer dan 2 soorten volstaan. Getoond worden *Th. danis apollonius* C. & R. Fld., *Th. phroso phroso* Gr. Smith, *Th. cyanea epicoritus* Bsd., *Th. wallacei regalis* Gr. Smith & Kirby, plus de onbekende soort.

Het genus *Hypochrysops*, van onderen rijk met metaalkleurige schubben bedekt, werd vertegenwoordigd door de gewone *H. eplicetus* C. & R. Fld. en de zeldzame *H. chrysargyria* Gr. Smith & Kirby (= *Iraota aurigena* Frhst., *Deudoryx meeki* Rtsch. en *Hypochrysops gemma* v. Eecke).

Van de in 1963 door G. E. TITE zo voortreffelijk bewerkte *Candalides*-groep werden aangetroffen de zeldzame *Holochila g. grandissima* B. Bkr., *Philiris regina* Butl. en *Philiris b. helena* Sn. 1884.

Het genus *Celastrina* werd vertegenwoordigd door 2 zeer uiteenlopende soorten: de kleine blauwe *C. drucei* B. Bkr. en de witte *C. meeki kunupiensis* Wind & Clench.

Van het bekende en overal in het Indo-Australische gebied rijk vertegenwoordigde genus *Jamides* werd slechts één soort gevonden, maar dan ook een bijzondere, nl. *J. nitens* Joic. & Talb., waaronder 2 vrouwelijke exemplaren welke sexe tot dusver onbekend was.

Voorts werden natuurlijk ook *Nacaduba*'s gevonden, t.w. *N. pactolus antalcidas* Frhst. en *Erysichton palmyra coelia* Gr. Smith.

Geëindigd werd met de grote soorten van de *Amblypodia*- en *Arhopala*-groepen. Van het genus *Amblypodia* werd de soort *elga* Frhst. aangetroffen met een enigszins afwijkend coloriet. Het genus *Narathura* werd vertegenwoordigd door 3 soorten: *N. alkisthenes* Frhst., *N. a. aexone* Hew. en *N. hercules leo* Druce, waarnaast *Arhopala thamyra phryxus* Bsd. een gewone verschijning was.

Summary

Demonstration of interesting Lycaenidae, caught by Mr. R. STRAATMAN in the Sepik valley, New Guinea, in 1963.

Rotterdam, Bentincklaan 37 A.