

November, 1904, 1905, and 1906 (A. E. WILEMAN).

2 ♂, 1 ♀ : Formosa.

1 ♀ : Japan, Toshima, Tobetsu, July 1903 (A. E. WILEMAN).

2 ♂ : Japan, Kyusyu, Amami Islands, Okinoerabu Is., Wadamari, 20.V.1960 em. (T. KODAMA), Bred f. *Ehretia?* sp.

1 ♀, Mindanao, Zamboanga del Sur, Zamboanga, 30.VI.1958 (H. E. MILLIRON). Bernice P. Bishop Museum, Honolulu.

This species has been recorded from Japan under the name of *E. duplicata* (MORIUTI, 1963: 36). CLARKE, 1965: 426, erroneously synonymized *E. duplicata* Meyrick with *E. bilarella* Walker.

#### Literature

CLARKE, J. F. G., 1965, Catalogue of the Type Specimens of Microlepidoptera in the British Museum (Natural History) described by Edward Meyrick 5 : 426, pl. 211 fig. 2—2a.

MORIUTI, S., 1963, Ethmiidae from the Amami-Gunto Islands, Southern Frontier of Japan, collected by Mr. T. Kodama in 1960. *Tyo To Ga* 14 : 36, fig. 2, 8—10, 13—14.

### *Xylomania patalis* Grote in Nederland gevangen (Lep., Noctuidae)

door

B. J. LEMPKE

In 1964 liet de heer KUCHLEIN mij een uil zien, die in Arnhem tegen een winkelraam gevonden was door de heer Sj. VAN DER MOLEN en die met geen enkele uit ons land bekende soort te identificeren was. De voorvleugels waren licht bruin-grijs. In zwart staken hier tegen af de (gedeeltelijke) omtrekken van de drie bekende vlekken, een wortelstreep en een rij pijlvlekken, die naar de apex toe



*Xylomania patalis* Grote. Genitaal-apparaat van het ♂ en vleugeltekening. Lengte voorvleugel 12 mm. Prep. LEMPKE nr. 901.

steeds zwakker werden. Heel flauw was ook nog iets te zien van een gegolfde tweede dwarslijn. De achtervleugels waren witachtig bruingrijs, langs de achterrand iets donkerder.

Noch in de collectie van het Amsterdamse Zoölogisch Museum, noch in de plaatwerken van SEITZ en CULOT was overigens ook maar een spoor te vinden van een vlinder, die in aanmerking zou kunnen komen als representant van de Arnhemse uil. Een preparaat van het genitaal-apparaat maakte de zaak nog raadselachtiger. De vorm van de valven deed nogal denken aan een *Mythimna*, maar soorten van dit geslacht behoren net als een *Mamestra* duidelijk behaarde ogen te hebben. En daarvan was bij deze uil geen spoor te ontdekken. Bovendien bezat elke valve een beweegbare plaat (op de linker kleiner dan op de rechter), een kenmerk, dat ik me niet herinnerde ooit in de literatuur over Europese uilen vermeld gezien te hebben. En dan de lange slangvormige rij doorns in de penis! Kortom, het dier was voor mij volkomen onbepaald.

Toen ik tot deze conclusie gekomen was, stuurde ik de uil maar naar de altijd even behulpzame Mr. D. S. FLETCHER van het Brits Museum (Nat. Hist.), die mij kort daarna schreef, dat de naam luidde: *Xylomania patalis* Grote, een Noord-amerikaanse Noctuide. Hoe die in Arnhem verzeild is geraakt, zal wel altijd een raadsel blijven. Maar, zoals ik onlangs al schreef, het aantal van zulke verrassingen zal eer toe- dan afnemen.

Hoewel de kans, dat deze soort nog eens in ons land aangetroffen zal worden, niet bijster groot is, geef ik toch maar een afbeelding van het genitaal-apparaat en van de vleugeltekening. Het exemplaar, dat zich in de collectie van de heer VAN DER MOLEN bevindt, verkeert helaas in te desolate toestand om gefotografeerd te worden.

### Summary

In 1964 a moth was met with on a shop-window at Arnhem (Gelderland prov.) which Mr. D. S. FLETCHER (British Museum, Nat. Hist.) kindly identified as the North American *Xylomania patalis* Grote. A figure of the male genitalia and of the wing markings is given.

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12 III.

---

Afdeling Zuid-Holland. De afdeling zal dit jaar vergaderen op 26 oktober en 14 december in Hotel „Terminus”, Stationsplein, Den Haag, des avonds om 8 uur.

Omtrent de andere vergaderingen kunnen nog geen mededelingen gedaan worden, aangezien er tussen de leden nog overleg moet plaats vinden over de plaats, waar dat zal gebeuren. Per circulaire zal een en ander aan de leden in Zuid-Holland bekend gemaakt worden.

I. A. KAIJADOE, Secretaris.

---