

595.106492

EL61
Smt,

JUN 10 1965

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 25	1 januari 1965	No. 1
---------	----------------	-------

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD : G. den Hoed : Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.). VI (p. 1). — D. Hille Ris Lambers and G. H. L. Dicker : Aphis triglochis Theobald, 1926, as a pest of Red Currant (*Ribes rubrum* L.) and Black Currant (*Ribes nigrum* L.) (Homoptera, Aphididae) (p. 5). — C. A. W. Jeekel : A new genus and a new species of the family Paradoxosomatidae from Australia (Diplopoda, Polydesmida) (p. 7). — W. A. Windrich : Het territorium van de rups van het fruitmotje (p. 15). — G. W. Ankersmit : Over enkele consequenties van de fotoperiodieke reactie van *Ceuthorrhynchus pleurostigma* (Col., Curc.) (p. 16). — J. de Wilde, Mej. B. M. Th. Bier en Mej. J. A. de Boer : Hersenoperaties bij de Coloradokever (p. 18). — J. A. Nijkamp-Prijs (p. 20). — Literatuur (p. 19 : P. J. Brakman). — Korte mededelingen (p. 4 : G. M. Bogaard, G. J. Flint; p. 6 : J. Jansen Jr.; p. 14, 20 : A. W. P. Maassen; p. 14 : W. Oord; p. 19 : C. J. Zwakhals, XXe Congrès international Jubilaire d'Apiculture).

Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.). VI

door

G. DEN HOED

Notities bij Ichneumonini (vervolg)

3. *Ichneumon* L. s.str.

Het genus *Ichneumon* L. s.lat. was een volslagen onoverzichtelijke massa soorten, waaruit vele systematici diverse genera dan wel subgenera hebben gelicht. Tenslotte is een nog niet bevredigende soortengroep overgebleven: *Ichneumon* L. s.str. Hierin zijn ca. 150 Europese species ondergebracht, waarvan er in Nederland 40—50 zullen voorkomen. Het opmaken van de Nederlandse soortenlijst is moeilijk, omdat er maar enkele recente collecties zijn; bovendien zouden de collecties van SNELLEN VAN VOLLENHOVEN (Leiden), van SMITS VAN BURGST en KOORNNEEF (Wageningen), LINDEMANS (Rotterdam) en OUDEMANS (Amsterdam) geheel moeten worden gereviseerd; terwijl de collectie-TEUNISSEN (Berghem) niet meer toegankelijk schijnt te zijn.

De determinatie stuit op verschillende moeilijkheden:

- Door vroegere auteurs werd te veel waarde gehecht aan kleurkenmerken, terwijl juist het kleurpatroon vaak zeer variabel is. Naast het moderne typenonderzoek moeten betrouwbaarder kenmerken naar structuur en sculptuur uitkomst brengen.
- Vaak is nog niet bekend welk ♂ bij welk ♀ hoort.
- Voor het onderscheid tussen de div. ♂ ♂ schijnt genitaalonderzoek geen uitkomsten te bieden.
- Er zijn te weinig series uitgekweekte specimen, zodat de variatie-breedte binnen de soort nog niet voldoende bekend is.

JUN 1 1965

HOVEN. Een enkel ♀ van Lochem, aug. 1900, zou ik hiertoe willen rekenen, hoe wel de determinatie van *SCHMIEDEKNECHT I. insidiosus* Wesm. was. Zeker zeldzaam hier!

Ichn. insidiosus Wesm. en *Ichn. croceipes* Wesm. Hoewel in oudere collecties als zodanig gedetermineerd materiaal voorkomt, twijfel ik nog aan de juistheid daarvan. Recenter materiaal heb ik niet gezien.

Ichn. sulphuratus Kriechb. dient uit mijn soortenlijst te vervallen.

16. *Ichn. latrator* F. is hier algemeen.

Ichn. subquadratus Thoms. eveneens algemeen.

Ichn. memorator Wesm. Een enkel ♀ van Leersum, aug. 1920, overigens alleen ♂ ♂.

Ichn. incomptus Holmgr. Van deze soort schijnen ook de ♀ ♀ moeilijk te worden ingezameld, slechts op grond van ♂ materiaal kan ik het hier voorkomen aannemen.

Opm. *Ichn. pachymerus* Ratz. in mijn lijst onder *Ichn. neumon*, kan beter naar *Barichneumon* Thoms.

Tenslotte mijn dank voor de mij door de heer K. W. R. ZWART (Wageningen) verleende hulp.

Summary

Notes on the species of the genus *Ichn. neumon* occurring in the Netherlands.

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325.

Nymphalis polychloros L. (Lep., Nymphalidae). Op 17 april 1964 ging ik voor het eerst van het jaar weer eens naar het „Donkere Bos” te Bolnes. Alleen maar, om wat rond te kijken en daarom nam ik geen net mee. Op een open plek zag ik opeens een vlinder vliegen, die me op het eerste gezicht toeleek een kleine vos te zijn. Maar bij nadere beschouwing vond ik het dier daarvoor toch wel wat te groot en toen de vlinder op de grond ging zitten, zag ik, dat het een *polychloros* was, en nog wel een prachtig gave ook! Hij bleef op die open plek maar om me heen dartelen, soms rakelings om me heen en toen (ik hield me doodstil) ging hij op mijn hoofd zitten. Hij vloog weer op, zette zich op mijn schouder, daarna op mijn hand. Voorzichtig nam ik de vangfles (die ik natuurlijk wel meegenomen had) in mijn rechter hand en nu nam de vlinder uitgerekend op die hand plaats. Daarna wipte hij weer over op mijn linkerhand en nu leek me de kans schoon. Maar toen ik op een haar na de fles over hem heen had, schoot hij ineens pijlsnel omhoog en verdween over de bomen het bos in. Ik heb de vlinder daarna niet meer terug gezien.

Dit is de tweede *polychloros*, die in deze streek is waargenomen. De eerste werd 23 juli 1960 door TOPEYUS te Zwijndrecht op een *Buddleja* gevangen.

G. M. BOGAARD, Burg. van Akenwijk 8a, Hendrik-Ido-Ambacht.

Euphyia luctuata Schiff. (Lep., Geom.). Dat deze spanner zijn vlieggebied nog altijd aan het uitbreiden is, blijkt uit het voorkomen te Raalte. Begin juni 1963 vond ik de vlinders in aantal in daartoe geschikte dennenbossen langs de spoorbaan tussen Raalte en Heino. Maar het is bepaald een recente vestiging, daar ik de voorafgaande jaren deze streek altijd goed op *luctuata* doorzocht heb en de vlinder niet eerder dan in 1963 aantrof.

G. J. FLINT, Swaefkenstr. 39, Deventer.