

Mededelingen over Lepidoptera

door

G. A. BENTINCK

Op de 97e Wintervergadering van 7 februari 1965 demonstreerde ik de volgende Lepidoptera, die in meer of mindere mate zeldzaam zijn voor onze fauna.

I. MACROLEPIDOPTERA:

1. Een exemplaar van *Hadena compta* Schiff. (de soort met de witte middenband) op 16 juni 1964 te Amerongen gevangen.
2. Een exemplaar van *Mythimna l-album* L. op 26 september 1964 te Amerongen gevangen.
3. Twee exemplaren van *Schrankia taenialis* Hb., respectievelijk op 8 juni 1964 te Ommen en op 18 augustus 1964 te Amerongen gevangen.
4. Een exemplaar van *Sterrhia biselata* Hfn. (*bisetata* Rott.), f. *griseata* Preiss-ecker, op 31 juli 1964 te Amerongen gevangen; de vleugels zijn donker bestoven, alleen de normaal donker beschaduwde golflijn en de franje blijven zuiver geelachtig; zeldzaam.
5. Een exemplaar van *Dysstroma truncata* Hfn., f. *nigerrimata* Fuchs op 22 juni 1962 te Valkenburg gevangen. Alle vleugels vrijwel eenkleurig zwart; vrij zeldzaam.

II. MICROLEPIDOPTERA:

1. Vijf exemplaren van *Cerostoma scabrella* L. tussen 7 juli en 30 augustus 1964 te Amerongen gevangen.
2. Een exemplaar van *Lithocolletis froelichiella* Z. op 7 juni 1964 te Ommen gevangen.
3. Een exemplaar van *Epinotia granitana* H.S. (*Steganoptycha granitana*) op 7 juni 1964 te Ommen gevangen; zeldzaam.

Summary

Some more or less rare and local species of Lepidoptera, taken in a few localities in the Netherlands in 1964 and previous years.

Amsterdam-Z 1, Saxen Weimarlaan 22.

Coenobia rufa Hw. (Lep., Noctuidae). Nog steeds een lokale en tamelijk zeldzame soort, maar er worden wel meer vindplaatsen bekend. Op 12 augustus 1964 ving ik een exemplaar in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. In Cat.-LEMPKE wordt de soort uit Amsterdam vermeld uit een moerasje, dat destijds aan de Zuiderzeedijk bij Zomerlust lag. Dat moerasje is lang geleden verdwenen door de verbreding van het Merwedekanaal en sindsdien is de soort, voor zover mij bekend, niet meer uit Amsterdam vermeld. De rups leeft op *Juncus articulatus* (waterrus) en het typische biotoop van de soort wordt gevormd door moerassige plaatsen met zoet of brak water en mogelijk duinvalleien waar de voedselplant voorkomt. Dit biotoop is bij de vangplaats in het Amsterdamse Bos in de nabij gelegen oeverlanden aanwezig.

M. P. PEERDEMAN, Westlandgracht 175 II, Amsterdam - Overt. Veld.