

*Temnostoma bombylans* F. Bunder Bos, 21.VI.1964, ♀. Zeer zeldzaam.

*Triglyphus primus* Lw. Opnieuw een exemplaar te Brunssum, 11.V.1964 en twee exemplaren te Echt, 21.VIII.1964.

*Tubifera hybrida* Lw. Hollandse Rading, Zevenbergen, Breda, Oisterwijk.

*Xanthandrus comtus* Harris. Rotterdam, 19—23.VIII.1964, ♀. Ik vond het dier dood in de vensterbank van mijn huiskamer.

*Zelima florum* F. Lage Vuursche, 8.VI.1964, drie ♂♂; Bunder Bos, 21.VI.1964, ♂.

*Zel. nemorum* F. Hollandse Rading, 14.VII.1964, ♂; Ulvenhout, 17.VII.1964, ♂.

*Zel. sylvarum* L. Lage Vuursche, Ulvenhout, Savelsbos en Bunder Bos.

*Zel. xanthocnema* Collin. Het is merkwaardig, dat deze soort, vlak nadat VAN DER GOOT een tweetal exemplaren in de collectie van het Leids Museum herkende als te behoren tot deze voor ons land nog onbekende soort, is terug gevonden. Ik ving een ♂ in het Savelsbos (Rijckholt), 14.VI.1964. Reeds in het veld vielen de lichte vlekken op het achterlijf op, reden ook, waarom ik het dier ving. Ook VAN DER GOOT ving de soort dit jaar, namelijk te Bunde, 12—14.VII.1964, welk exemplaar ik op zijn verzoek hier vermeld.

Naast Syrphiden verzamelde ik ook Asiliden. Hierbij zaten:

*Dioctria linearis* F. Reeds vorige wintervergadering kon ik de soort vermelden. In 1964 ving ik hem opnieuw, namelijk te Rijckholt, Savelsbos, 14.VI.1964, drie exemplaren en in het Bunder Bos, 21.VI.1964, één exemplaar. De soort lijkt dus wel minder zeldzaam dan verondersteld wordt.

*Neoitamus cothurnatus* Mg. Rijckholt, Savelsbos, 14.VI.1964, een achttal exemplaren; Bunder Bos, 21.VI.1964, één exemplaar.

*Rhadiurgus variabilis* Zett. Soestduinen, 25.V.1964, één exemplaar.

### Summary

The year 1964 was very favourable for the collection of Syrphids. An enumeration of the more important data on them, together with some on Asilids, is given. Among them is *Cheilosia carbonaria* Egg., a species hitherto not found in the Netherlands.

---

*Autographa pulchrina* Hb. (Lep., Noctuidae). Van dit dier ving ik in 1963 en 1964 enkele vrij verse exemplaren in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. Voor zover mij bekend is de soort nog niet eerder uit Amsterdam of het „Bos” vermeld. Volgens Cat.-LEMPKE komt de soort voor in de zandstreken en bosachtige gebieden, ook in de duinen. Als voedselplanten worden genoemd lage planten o.a. *Urtica* spec., *Lamium album* en *Lonicera* spec. Vooral de twee eerstgenoemde planten zijn goed vertegenwoordigd in het „Bos”.

M. P. PEERDEMAN, Westlandgracht 175 II, Amsterdam - Overt. Veld.

*Peribatodes secundaria* Schiff., f. *nigrata* Sterneck (Lep., Geom.). Van deze door PEERDEMAN (*Ent. Ber.* 22 : 43, 1962) als nieuw voor Nederland vermelde vorm ving ik enkele exx. te Montfort: 2 wijfjes, 19 en 23 juli 1963.

A. W. P. MAASSEN, Montfort (L.).