

tientallen ♂♂ van deze soort zaten, terwijl in de rest van het gebied met een soortgelijke vegetatie slechts één exemplaar werd verzameld. De ♀♀ zullen wel niet gevangen zijn door hun andere levenswijze.

Cerioides subsessilis Illig. 1 ♀ op 5.VI in het Onderste Bos. Deze zeldzame soort wordt de laatste tijd iets vaker gevangen.

Zelima abiens Meig. 1 ♂ in het Holseterbos (4.VI). Deze soort staat qua habitus tussen *Z. nemorum* Fabr. en *Z. florum* Fabr. in. De gele vlekken op het achterlijf zijn zeer duidelijk (althans bij mijn exemplaar), waardoor het dier op een lange, slanke *nemorum* lijkt. Deze indruk wordt nog versterkt door de verdikte dijen van poot drie. Een goed verschilpunt met *nemorum* is echter de aanwezigheid van doortjes op de trochanters van het derde pootpaar, die bij *nemorum* ontbreken. Een onderscheid met *florum* vormen de bij *abiens* verdikte dijen van het derde pootpaar, terwijl bij *florum* de dijen van dit potenpaar niet verdikt zijn. Bovendien is de scheen van de derde poot bij *abiens* aan de basis voor maximaal $\frac{1}{5}$ geel gekleurd, terwijl deze scheen bij *florum* minstens voor $\frac{1}{3}$ deel geel is. Een derde verschil tussen *florum* en *abiens* is gelegen in het feit, dat de achterlijfspunt bij *abiens* geel-wit, bij *florum* zwart behaard is.

Zelima florum Fabr. 1 ♀ in het Holseterbos op 4.VI.

Zelima xanthocnema Coll. Van deze, kortgeleden door VAN DER GOOT als nieuw voor de Nederlandse fauna vermelde soort ving ik een ♂ op 5.VI in het Onderste Bos, tezamen met een tiental exemplaren van *Z. sylvarum* L. en enkele *Z. lenta* Meig. Deze soort lijkt sterk op *Z. sylvarum*, maar onderscheidt zich ervan door de geheel gele schenen van het derde pootpaar en door de aanwezigheid van gele vlekjes op segment twee en drie van het achterlijf.

Temnostoma bombylans Fabr. is een soort, die langzamerhand niet meer tot de grote zeldzaamheden gerekend mag worden; hij is echter wel beperkt tot Z.-Limburg. LUCAS vermeldt ± 16 exemplaren van een viertal vindplaatsen (*Ent. Ber.* 24 : 230). Ik kan hier nog het Eysderbos als vindplaats aan toevoegen, waar ik 1 ♂ en 1 ♀ ving, al moet opgemerkt worden, dat ik meerdere exemplaren heb gezien, die ik echter door de ontoegankelijkheid van het terrein niet kon vangen.

Temnostoma vespiforme L. Op 3.VI.1963 zag ik in de Schoene Grub een exemplaar van deze soort, dat echter jammer genoeg niet gevangen kon worden.

Tot slot kan ik nog 2 ♂♂ van *Eumerus flavitarsis* Zett. vermelden, verzameld in het Wasche-dal bij Malmédy in de Ardennen op 5.VI.1960. Deze soort is nieuw voor de Belgische fauna.

Summary

A survey is given of some interesting Syrphid-flies found in the Netherlands in 1964. Important is the first record of *Brachyopa conica* Panz. in the Netherlands. New to the Belgian fauna is *Eumerus flavitarsis* Zett.

Waterweg 203, De Bilt.

Omosita depressa L. (Col.). Van deze zeldzame kever klopte ik 23 mei 1964 acht exemplaren uit de droge resten van een dode kip met een exemplaar van *Trox sabulosus* L.

A. C. NONNEKENS, Da Costalaan 48, Amstelveen.