

Chiasmia clathrata L. — deze soort is alleen bekend uit 1958 (D).

* *Aegeria formicaeformis* Esp. — één exemplaar werd waargenomen op 28 augustus 1961 in het Grijtjeplak.

* *Hepialus sylvina* L. — D; regelmatig in klein aantal in de omgeving van de loofbosjes van de binnenduinen; augustus.

TABEL

Aantal soorten Macrolepidoptera t.m. 31 maart 1963 op Terschelling vastgesteld

Papilionidae	1	Thyatiridae	6	Cossidae	2
Pieridae	8	Drepanidae	6	Limacodidae	1
Nymphalidae	12	Lymantriidae	5	Psychidae	1
Satyridae	7	Noctuidae	161	Zygaenidae	4
Lycaenidae	8	Lasiocampidae	7	Sesiidae	2
Hesperiidae	5	Nolidae	4	Hepialidae	2
Sphingidae	1	Arctiidae	20	Totaal	386 soorten
Notodontidae	13	Geometridae	100		

Summary

List of Macrolepidoptera observed on the island of Terschelling (one of the "wadden islands" belonging to the province of Friesland) up to and inclusive March 1963.

Joose-van Damme, E. N. G., Oerinsekten - Apterygota. Wetenschappelijke Mededeling no. 48 van de Kon. Ned. Natuurhist. Ver. Juli 1963. In deze nieuwe insekten-publicatie van de K.N.N.V. behandelt de schrijfster de oudste en primitiefste insekten, de Collembola, Protura, Diplura en Thysanura. Het is geen determineerwerk, waarmee alle uit ons land bekende soorten op naam gebracht kunnen worden, maar eigenlijk een moderne algemene inleiding, die voor een belangstellende leek tal van wetenswaardigheden bevat. Bovendien op een bevattelijke prettige manier geschreven, zodat het een plezier is het werkje door te lezen. Tal van illustraties verduidelijken de tekst. Biezonder interessant zijn de hoofdstukjes, die de biologie en de oecologie van deze merkwaardige dieren behandelen. Zij die zich verder in deze groepen willen verdiepen, vinden aan het eind een opgave van moderne publicaties erover. Weer een voortreffelijke aanwinst voor de bekende serie.

De prijs bedraagt voor leden van K.N.N.V. en Ned. Ent. Ver. f 2,25, te voldoen door storting op postrekening 13028 ten name van het Bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud - N.H., waarna toezending volgt. — Lpk.

Araschnia levana L. in 1963 (Lep., Nymphalidae). Alleen de heer NEIJTS heeft gereageerd op mijn verzoek om mededeling over het voorkomen van de vlinder in 1963. In de omgeving van Nuenen kwam hij slechts sporadisch voor. Alleen een paar exemplaren van de donkere zomergeneratie werden waargenomen.

Duidelijk blijkt hieruit, hoe noodzakelijk het is op de soort te blijven letten. Ik hoop dan ook op meer berichten aan het eind van 1964. Ook negatieve uit gebieden waar *levana* blijkens de ervaringen van de laatste 20 jaar zou moeten voorkomen. — Lpk.