

595.706492

E 61

Ent

406 20 1964

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 24

1 april 1964

No. 4

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJsselstraar 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD : G. den Hoed : Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.), V (p. 61). — W. J. Boer Leffef : Lepidopterologische notities (p. 63). — Eduard Wagner und James A. Slater : Zur Systematik der Blissinae Stål in der Paläarktis (Hem. Het. Lygaeidae) (p. 66). — Horst Aspöck : Coniopteryx hölzeli nov. spec., ein neues europäisches Neuropteron (p. 77). — A. J. Besseling : Les Hydrachnides de P. Groult (p. 79). — Literatuur (p. 65 : B. J. Lempke). — Korte mededelingen (p. 65 : B. J. Lempke ; p. 76 : A. W. P. Maassen, Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera ; p. 78 : Aanbieding).

Bijdragen tot de studie der Ichneumonidae (Hym.), V

door

G. DEN HOED

NOTITIES BIJ ICHNEUMONINI.

1. *Stenichneumon* Thoms.

De soorten, die tot dit genus gerekend werden, vertonen onderling een al te grote verscheidenheid, vandaar, dat G. HEINRICH mede op grond van Amerikaans materiaal inmiddels is overgegaan tot splitsing in: *Stenichneumon* Thoms., *Orgichneumon* Heinr. en *Intermedichneumon* Heinr. Deze indeling is hier nog niet overgenomen.

Sten. militarius Thunb. (*Ichn. pistorius* Grav.) is in Nederland vrij algemeen en wordt gekweekt uit *Autographa gamma* L. Deze soort is type-species van het genus en makkelijk herkenbaar. Ook hier als ♀ overwinterend.

Sten. culpator Schrank is in Nederland algemeen, schijnt nogal polyfaag te zijn, maar is hier bij mijn weten alleen gekweekt uit *Chrysaspidea festucae* L. De genokte coxae III van het ♀ zijn uniek in de Ichneumonini; pas in de Phaeogenini en makkelijk herkenbaar. Ook hier overwinterend als vrouwelijke imago.

Sten. lineator F. (*Ichn. trilineatus* auct., *Ichn. binotatus* Steph.). Het materiaal in oudere verzamelingen en oudere soortenlijsten dienen te worden gecorrigeerd op de verwarrende synonymie. *Ichn. lineator* auct. is *Coelichn. comitator* L. en het vaak vermelde synoniem *Ichn. leucomelas* Gmel. dient hierbij te vervallen. *Ichn. leucomelas* Gmel. is *Barichn. albilineatus* Grav. *Sten. lineator* F. is in Nederland niet algemeen; vindplaatsen vooral Zuid-Limburg. Gastheer blijkt te zijn *Abraxas grossulariata* L.

Sten. scutellator Grav. is en wordt vaak verward met de vorige soort en schijnt vrij zeldzaam te zijn. Alle Nederlandse exemplaren, die ik heb gezien, zijn uit oudere collecties.

Sten. rufinus Grav. Hieronder breng ik 5 in Nederland gevangen ♂♂; vindplaatsen Veluwe en Het Gooi. Er zal wel meer in bestaande collecties aanwezig zijn, maar dan verscholen tussen soorten van *Coelichneumon*.

Sten. alboguttatus Grav. (*Ichn. multicinctus* Grav.). Zou in Engeland niet voorkomen. Slechts 1 ♂ uit Putten (det. TEUNISSEN) vormt het bewijs voor mij, dat deze meer zuidelijk voorkomende soort ook wel eens in Nederland komt.

Ichneumon haesitator Wesm. wordt ook wel tot *Stenichneumon* gerekend en staat o.m. vermeld in een soortenlijst voor N.W.-Duitsland. Hiervan heb ik nog geen Nederlands materiaal gezien.

2. *Eupalamus* Wesm.

Naar de vorm van de thyridiën op het abdomen-segment II kan dit genus naast *Cratichneumon* worden geplaatst.

Eup. oscillator Wesm. (*Ichn. deliratorius* Grav.) is het type-species voor dit genus. Het verschil met *Eup. wesmaeli* Thoms. is mij niet duidelijk, dus reken ik het mij ter beschikking staande materiaal tot één soort. PERKINS noemt voor Engeland *Eup. oscillator* Wesm. niet en vermeldt *Eup. wesmaeli* Thoms. als zeldzaam. In Nederland is deze soort zeker niet zeldzaam; slechts moeilijk te vangen: vrij snel en naar mijn ervaring steeds in de buurt van bramen-vegetaties. Gastheren schijnen niet bekend te zijn.

Eup. lacteator Grav. (*Ichn. depexus* Wesm.) komt zeer verspreid ook in Nederland voor: Hilversum en Oisterwijk. Gastheer onbekend.

Eup. lamentator Thunb. (*Ichn. trentepohlii* Wesm.). Hiervan is door ROMAN de type-species gecontroleerd. Ik zou op grond van de beschrijving hiertoe enkele ♂♂ uit Hilversum moeten rekenen. Maar ik vermoed, dat de witte tekening van het zg. scutellum niet constant is en zo blijft slechts de langere area superomedia als eventueel kenmerk. Op uitgebreid materiaal zou dit dienen te worden gecontroleerd.

Summary

Notes on Dutch Ichneumonidae.

Stenichneumon militarius Thunb. Rather common, bred from *Autographa gamma* L.

Sten. culpator Schrank. Common, as far as known at present only bred from *Chrysaspidea festucae* L.

Sten. lineator F. Not common; especially in the south of Dutch Limburg. From *Abraxas grossulariata* L.

Sten. scutellator Grav. Only present in older collections.

Ichneumon haesitator Wesm. Not yet known from the Netherlands.

Eupalamus oscillator Wesm. Not rare, always in the vicinity of blackberries.

Eup. lacteator Grav. Very local.

Eup. lamentator Thunb. A few males only.

Hilversum, Oude Amersfoortseweg 325.