

seitlicher Betrachtung (Fig. 9e) nur  $1,1 \times$  so hoch wie lang und erscheint daher leicht vorgestreckt. Das Auge ist rund und vom Vorderrande des Pronotum um etwa ein Drittel seines Durchmessers entfernt. Von oben gesehen (Fig. 9d) ist nicht nur die Spitze des Tylus, sondern auch diejenige der Wangen sichtbar. Die Fühler (Fig. 9, f + g) sind auffallend kurz und  $1,0 \times$  so lang wie das Pronotum breit ist, das 4. Glied ist etwas länger als das 2. Bei der f. brach. (Fig. 9, a + c) überragen die Halbdecken kaum die Scutellumspitze nach hinten und die Membran ist nur ein schmaler Saum. Die Vorderschenkel haben unterseits im basalen Drittel einen großen Zahn und näher zur Spitze 2 kleinere (Fig. 9h). Die Vorder-schienen sind nur an der Spitze gezähnt. Die distale Außenkante hat nur 2 Zähne, darüber sitzt jederseits ein weiterer, die Innenkante weist 4 Zähne auf, über denen 2 kleinere sitzen.

Genitalsegment des  $\delta$  (Fig. 9k) breiter als lang. Rand der Genitalöffnung mit spitzer Ecke, sonst glatt. Parameren (Fig. 9, l + m) kürzer und etwas dicker als bei *Stenoblissus* nov. gen., aber sonst von dem für die Gattung charakteristischen Bau. Die Art hat demnach die für *Blissus* Burm. typische Gestalt und steht in der Form des Kopfes zwischen *Stenoblissus* nov. gen. und *Dimorphopterus* Stål. Alle übrigen Merkmale aber entsprechen denen von *Stenoblissus* nov. gen. Die Art wird daher in diese Gattung gestellt.

#### Literatur

- DOHRN, A., 1860, Hemipterologische Miscellaneen, *Stett. ent. Zeit.* 21: 161—162.  
 HIDAKA, T., 1959, Studies on the Lygaeidae XVIII, a new genus of the subfamily Blissinae from Japan, *Kontyu* 27: 269—271.  
 SAJO, K., 1880, Die bisher unbekannte makroptere Form von *Blissus Doriae* Ferr., *Ent. Nachr.*: 235—247.  
 STICHEL, W., 1958, Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen 2, Europa, 4: 103—109. Berlin, Selbstverlag.

Enkele late vangsten in 1963 (Lep.). *Zygaena trifolii* Esp. diverse exemplaren op 5 augustus te Montfort.

*Zygaena filipendulae* L. afgevlogen, maar ook nog vrij verse exemplaren op 8 september te Eijs.

*Amathes xanthographa* Schiff. Op 21 oktober één exemplaar te Montfort.

*Bena prasinana* L. een vers exemplaar op 7 augustus te Montfort (tweede generatie?).

*Abrostola tripartita* Hufn. Een exemplaar van de tweede generatie op 16 september te Montfort.

*Anagoga pulveraria* L. Twee exemplaren op 20 augustus te Montfort.

A. W. P. MAASSEN, Montfort (L.).

Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Het tiende supplement kan bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O, besteld worden. Het verschijnt iets later dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Daar staat tegenover, dat het 88 pagina's telt en geïllustreerd is met 7 platen. Behandeld worden de Hadeninae (d.w.z. alle soorten uit deel V) en enkele genera van de Cuculliinae (uit deel VI). Prijs voor leden f. 6,— en voor niet-leden f. 15,—.