

De bestrijding van deze mijten leverde een aantal moeilijkheden op, die door de betrokkene zelf werden opgelost. Wij adviseerden $1\frac{1}{2}\%$ malathion stuifpoeder, dat ook in de U.S.A. tegen dergelijke mijten wordt aanbevolen, te gebruiken. De betreffende mijt leeft uitsluitend op de vogels en niet in de hokken of nesten. De mijten bevinden zich vooral aan de hals en de staartwortel.

Te Groenlo werden op een boomkwekerij liguster-struiken aangetast door galmijten van de soort *Eriophyes loewi* (Nal). Deze galmijt is vooral bekend van *Syringa*, maar ook op *Ligustrum* schijnt hij te kunnen voorkomen. Het schadebeeld bij *Syringa* bestaat uit sterk vertakte twijgen met schubvormige bladeren, waardoor een soort heksebezem ontstaat. De betreffende ligusterstruiken vertoonden vooral bladeren met een veel donkerder kleur.

DIPLOPODA

Te Soest deed zich in een particuliere woning een plaag voor van de miljoenpoot *Polyxenus lagurus* (L.). De dieren ontwikkelden zich in het rieten dak van het huis. JEEKEL (1953) vermeldt deze soort als zeer lokaal en slechts plaatselijk talrijk. Volgens deze auteur leeft *P. lagurus* dikwijls in kolonies onder losse boomchors. Wij hebben deze miljoenpoot éénmaal eerder massaal aangetroffen in een boerderij te Gouda.

Summary

Notes on some insects which caused damage in the Netherlands in 1963.

Literatuur

- Anonymous, Verslag over de werkzaamheden van de Plantenziektenkundige Dienst in het jaar 1924. *Versl. & Med. v.d. P.D.* 41 : 20.
- , id. het jaar 1939. *Versl. & Med. v.d. P.D.* 95 : 54.
- BOVEN, J. K. A. VAN, 1959, Vliesvleugelige insekten — Hymenoptera; VI mieren (Formicidae), *Wetensch. Med. Kon. Ned. Nath. Ver.* 30.
- GREEN, A. A. & J. KANE, 1958, *Lasius brunneus* (Latr.) as a domestic pest. *Ent. Mo. Mag.* 94 : 181.
- JEEKEL, C. A. W., 1953, De Millioenpoten (Diplopoda) van Nederland, *Wetensch. Med. Kon. Ned. Nath. Ver.* 9.
- KANE, J. & P. S. TYLER, 1959, Domestic infestations by *Lasius brunneus* (Latr.). *Ent. Mo. Mag.* 94 : 286.
- ROSSEM, G. VAN, H. C. BURGER & C. F. VAN DE BUND, 1959, Verslag over het optreden van enige schadelijke insekten in het jaar 1958. *Ent. Ber.* 19 : 87.
- , id. in het jaar 1959. *Ent. Ber.* 20 : 123.
- , id. in het jaar 1961. *Ent. Ber.* 22 : 127.

Tethea or, f. *albingoradiata* Bunge (Lep., Thyatiridae). Bij een kleine serie vlinders, die de heer FLINT mij ter determinatie toestuurde, bevond zich een mooi exemplaar van deze voor ons land nieuwe vorm. De voorvleugels zijn zwart als bij f. *albingensis* Warnecke, maar tussen de aderen bevinden zich brede witachtige strepen, die evenals de beide vlekken scherp afsteken tegen de donkere grondkleur. Oorspronkelijk beschreven uit de omgeving van Hamburg. — LPK.