

## Nieuwe gegevens over Nederlandse Diptera

door

J. A. W. LUCAS

In de laatste jaren zijn door de N.J.N. en de K.N.N.V. een serie tabellen uitgegeven op het gebied der Nederlandse Dipteren, die het mij mogelijk maken een serie nieuwe gegevens over deze groep te publiceren. Deze publicatie moge dan ook allereerst een blijk van waardering voor auteurs en uitgevers zijn; daarnaast toont zij echter ook aan, hoeveel er nog aan deze groepen te werken valt.

### I. STRATIOMYIDAE. N.J.N. tabel, 1959, door VAN DER GOOT.

*Microchrysa flavicornis* Mg. Ik trof deze soort voornamelijk in vochtige streken aan, bv. te Noorden en te Rotterdam. De dieren komen nogal eens op licht af. Dat doet ook de wat algemenere *M. polita* L., die ook regelmatig op lagere planten te vinden is. De laatste soort trof ik nog begin september aan.

*M. cyaneiventris* Zett. was nog slechts bekend van Domburg, 13.VI.1909, 1 exemplaar. Op 19.V.1963 trof ik een exemplaar aan op de onderzijde van een boomblad te Echt (De Doort). Daarna vond ik 4 exemplaren in het Gerendal, 4.VI.1963: 1 in een spinneweb, 1 in de klauwen van een spin en 2 op bladeren van een heester. Tenslotte haalde ik nog een dier uit een spinneweb, ditmaal in het Bunder Bos, 4.VI.1963. Spinnen zijn blijkbaar nogal verzot op zeldzame soorten!

*Chrysochroma bipunctatum* Scop. VAN DER GOOT determineerde een aantal dieren uit mijn collectie als te behoren tot deze soort. Zij stammen van Bakkeveen, Duurswoude, Norg, Oostvoorne, Echt en Bunde.

*Sargus iridatus* Scop. kan al half mei vliegen en doorvliegen tot eind augustus.

*Stratiomyia potamida* Mg. Colmont, 3.VIII.1960, leg. G. SLOB. Zeer zeldzaam.

*Xylomyia marginata* Mg. vloog half augustus 1962 massaal te Echt op een paar gevelde stammen.

*Hermione trilineata* L. is, volgens de tabel, een soort van boombladeren. Op 11 en 12.VII.1962 trof ik de soort echter in aantal aan op het Groene Strand van Oostvoorne, waar ik hem, voornamelijk uit riet, sleepte. Van de heer VAN DER KRIFT ontving ik een drietal dieren van Berkel, gesleept uit lage begroeiing langs een slootkant.

*H. leonina* Panz. Een dier van Oostvoorne, 9.VIII.1962, op licht en een van Maastricht, aan de rand van het Cannerbos, 21.VIII.1962.

*H. pulchella* Mg. Ik ontving van de heer VAN DER KRIFT 4 exemplaren van deze soort, door hem te Nuth gevangen op 25.VII.1961, 27.VII.1962 en 2.VIII.1963.

*Beris vallata* Först. is zeker niet zonder meer aan bossen gebonden. Zo vond ik de soort op wat losse vlieren in de Zwarte Polder (Zeeuws Vlaanderen), op riet aan de Kralingse Plassen te Rotterdam en ook bij Den Helder trof ik de soort tussen kruidachtige planten aan.

*Chlorisops tibialis* Mg. Oostvoorne en Burgh, ook op licht. De soort kan al begin juli vliegen.

*Hoplodonta viridula* F. vliegt nog door tot begin september.

*Eulalia argentata* F. Spijk, 1.V.1961, leg. G. SLOB. Het vierde Nederlandse exemplaar.

*Nemoteles uliginosus* L., die nog tot begin september vliegt, is zeer gewoon in het Deltagebied. Van de andere *Nemoteles*-soorten ving ik op Voorne slechts 1 *N. pantherinus*. Bij een klein aantal exemplaren van Den Helder zaten echter alle vier *Nemoteles*-soorten, die uit Nederland bekend zijn.

*Pachygaster atra* Panz. vliegt reeds einde juni.

*P. leachi* Curt. Echt, 13.VIII.1962, 1 exemplaar.

II. ASILIDAE. N.J.N. tabel, 1960, door VAN DER GOOT.

*Dioctria linearis* F. Deze soort, die eerst kort geleden door VAN DER GOOT voor het eerst voor Nederland vermeld werd, trof ik te Rotterdam aan, 24.VI.1963, 2 exemplaren.

*D. rufipes* Deg. is lang niet zo zeldzaam als opgegeven wordt. Ik vond de soort o.a. te Gortel, Bemelen, Rijckholt en Nijswiller.

*D. hyalipennis* F. vloog nog op 16.VIII.1962.

*D. lateralis* F. Mesch, 27.VII.1963, 5 exemplaren, leg. VAN DER KRIFT. VAN DER GOOT, die mijn determinatie bevestigde, geeft slechts één exemplaar op, dat in de vorige eeuw bij Valkenburg verzameld werd.

*Laphria marginata* L. Het Woold, 31.VII.1958.

*Dysmachus picipes* Mg. was nog slechts tweemaal gevangen, te Houthem. Ik ving twee dieren te Bemelen, 1.VI.1963. Mijn determinatie werd door VAN DER GOOT bevestigd.

*Antipalus varipes* Mg. St. Joost, 11.VIII.1962, 1 exemplaar.

*Pamponerus germanicus* L. Vogelenzang, 16.VI.1963, 1 exemplaar.

*Rhadiurgus variabilis* Zett. Bennekom, 25.VI.1961, 2 exemplaren, waarvan 1 in coll.-VAN DER GOOT.

*Cerdistus geniculatus* Mg. Echt, 16.VIII.1962 en Montfort, 18.VIII.1962, samen drie stuks.

*Neomochtherus pallipes* Mg. Pey, 16.VIII.1962 en Nuth, 28.VIII.1963 (leg. VAN DER KRIFT), in totaal drie exemplaren.

III. CONOPIDAE. N.J.N. tabel, 1960, door VAN DER GOOT.

*Conops vesicularis* L. Hoenderloo, 10.V.1947, ♂ en ♀ in copula.

IV. TRYPETIDAE. K.N.N.V. tabel, 1959, door KABOS (W.M. 33).

*Phagocarpus permundus* (Harris) komt ook in Zuid-Holland voor: Oostvoorne, 1962, ook op licht.

*Noeeta pupillata* Fallen komt ook in Noord-Brabant voor: Zundert.

*Acinia corniculata* Zett. Groesbeek, de Bruuk, 19.VIII.1960, 1 exemplaar.

*Tephritis bardanae* Schrank. Diverse exemplaren van Oostvoorne, 1959 en 1961. Door KABOS alleen voor Haarlem opgegeven.

*Paroxyna plantaginis* Hal. Gewoon in het Deltagebied, doorvliegend tot begin september.

*Urophora cardui* L. zag ik nog te Echt op 13.VIII.1962.

*U. solstitialis* L. Brunssum, 10.VI.1963, 1 exemplaar. KABOS vermeldt alleen Lochem.

*Gonioglossum wiedemanni* Mg. ontving ik van de heer MAASSEN uit Montfort (L.).

V. TABANIDAE. K.N.N.V. tabel, 1960, door KABOS (W.M. 38).

*Chrysops sepulcralis* (Fabr.). Kotten en Echt. Zeldzame soort.

*Heptatoma pellucens* Fabr. is naar mijn mening niet zeldzaam. Ik trof de soort aan te Oegstgeest, Oostvoorne, Zierikzee en Brunssum.

*Chrysozona italica* Mg. Montfort.

*Chr. crassicornis* Wahlberg. Rotterdam.

VI. RHAGIONIDAE. K.N.N.V. tabel, 1963, door VAN DER GOOT (W.M. 46).

*Chrysopilus luteolus* Fall. Elspeet en Vierhouten, 1962.

*Chr. auratus* Mg. vliegt nog tot eind augustus.

*Chr. aureus* Mg. Rotterdam en Rijkholt, resp. in 1963 en 1962.

*Rhagio tringarius* L. zag ik o.a. op 16 en 19.IX.1962, *Rb. lineola* nog op 1.X.1961.

*Rhagio vitripennis* Mg. Deze soort is naar mijn mening in Zuid-Limburg een vrij gewone soort. Verder bezit ik een exemplaar van Oud Alblas, 8.VI.1963 en een van Tongeren, 17.VII.1962.

VII. THEREVIDAE. K.N.N.V. tabel, 1963, door VAN DER GOOT (W.M. 46).

*Thereva bipunctata* Mg. Meyndel en Oostvoorne.

*Tb. fulva* Mg. vloog nog op 3.IX.1962.

Gaarne wil ik tenslotte al diegenen danken, die mij materiaal schonken, in het bijzonder de heren VAN DER KRIFT en SLOB, alsmede de heer VAN DER GOOT voor de door hem verrichte determinaties.

### Summary

Discussion of rarer or more local Diptera, not belonging to the Syrphidae, taken in different parts of the Netherlands in 1963 and earlier.

---

## Syrphidae in 1963

door

J. A. W. LUCAS

In 1963 heb ik niet veel tijd gehad om intensief naar zweefvliegen uit te kijken; de meeste waarnemingen zijn dan ook van 1—4.VI en op 10.VI, in beide gevallen in Zuid-Limburg. Toch zijn de resultaten zeer goed geweest zoals al moge blijken uit het aantal soorten, dat ik per dag waarnam: op 1.VI 34, op 2.VI 39, op 3.VI 39, op 4.VI 42 en op 10.VI, te Brunssum, zelfs 48. De volgende soorten zijn vermeldenswaard: