1952 door Jhr. W. C. VAN HEURN en bij de „Slangenburg" te Doetinchem, in juli 1952 door W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN. Materiaal van deze vindplaatsen bevindt zich in de collectie van het Rijksherbarium.

Van *Phyteuma spicatum* geeft DOCTERS VAN LEEUWEN alleen een door een galmug, *Dasyneura phyteumatis* F. Lw., veroorzaakte bloemgal op, die evenals de *Miarus*-gal gevonden werd in het Ulvenhoutse bos. Hij vermeldt deze gal in een aanhangsel van zijn Gallenboek op p. 332.

Het zou zeker de moeite waard zijn ook op de andere Nederlandse vindplaatsen van de zeldzame *Phyteuma spicatum* eens op het voorkomen van genoemde, voor Nederland nieuwe, *Miarus*-gal te letten. Behalve van de vindplaats in het Ulvenhoutse bos, waar de soort thans ook nog voorkomt, is de witte rapunzel momenteel alleen nog maar bekend van „de Hondsdonk" bij Chaam, van de Leubeek in Midden-Limburg en van een paar plaatsen in de omgeving van Denekamp.

Summary

A gall caused by *Miarus campanulae* L. (Col., Curcul.) was found for the first time in the Netherlands on flowers of *Phyteuma spicatum* L.

Een voor Nederland nieuwe mijtgal op Alnus incana (L.) Vill.

door

S. J. VAN OOSTSTROOM

Van *Alnus incana* vermeldt DOCTERS VAN LEEUWEN (1957) in de 2e druk van zijn Gallenboek één door een Phytoptide veroorzaakte gal, die zich voordoet als geelachtige of soms bruine, aan beide zijden behaarde blazen aan de bovenzijde der bladeren. Een andere mijtgal op deze soort, geheel overeenkomend met die welke vaak op de bladeren van *Alnus glutinosa* (L.) Vill. aan de onderzijde, doch ook wel van boven wordt aangetroffen, en die bestaat uit eerst witte, later roodbruine viltkussens, werd door mij gevonden langs de weg aan de oostzijde van het Linschoterbos bij Linschoten, in juli 1962 (coll. VAN OOSTSTROOM no. 23130). Ook in 1964 kwam deze gal op genoemde plaats weer in grote hoeveelheid voor. De gal wordt, evenals die op *Alnus glutinosa,* veroorzaakt door de galmijt *Phytopus brevitarsus typicus* Nal.

Summary

A gall caused by *Phytoptus brevitarsus typicus* Nal. on the leaves of *Alnus incana* (L.) Vill. is mentioned for the first time from the Netherlands.

Anaplectoides prasina F. (Lep., Noct.). Op 20 juli 1963 ving ik van deze soort een exemplaar in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. Voor zover mij bekend is de soort nog nooit van Amsterdam vermeld. Volgens Cat.-LEMPKE wordt de soort lokaal en zeldzaam gevonden op zandgronden, ook in de duinen en in bosachtige streken. De rups leeft op allerlei lage planten en op braam en in het vroege voorjaar op uitkomende knoppen van allerlei struiken. Daardoor is de soort gebonden aan terreinen waar struikgewas voorkomt.

M. P. PEERDEMAN, Westlandgracht 175 II, Amsterdam - Overt. Veld.