

Dank zij de geregelde waarnemingen, welke over een geheel seizoen liepen, zijn de vliegtijdgrenzen der beide optredende generaties van *E. galiata* bekend geworden (kleine verschuivingen blijven uiteraard mogelijk).

Voor generatie één zijn deze: 15 mei tot 17 juli, voor generatie twee: 2 augustus tot 26 september.

Hoewel het entomologisch onderzoek van het Schouwense duindistrict nog in een beginstadium verkeert, is toch al reeds uit de verkregen gegevens duidelijk naar voren gekomen welke belangrijke en vooral aparte positie dit duingebied in Nederland vanwege zijn entomofauna inneemt. Het vormt een gunstig milieu voor zuidelijker georiënteerde vlindersoorten, die naar het noorden toe hun areaal tot en met hier hebben kunnen uitbreiden. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat zij nog tot onze fauna behoren. Zij bepalen mede en zeker niet in geringe mate de natuurwetenschappelijke waarde van deze duingebieden.

Gezien de instelling van een bepaalde categorie verzamelaars is het publiceren (dus bekend maken) van vindplaatsen van zeldzame soorten een vrij riskante zaak. Het kan namelijk aanleiding geven tot ongewenste vangpartijen. Aan de andere kant is het niet verstandig faunistische gegevens te verheimelijken. Het publiceren heeft ook zijn voordelen. In zekere zin wordt daardoor entomologisch onderzoek van entomologisch belangrijke terreinen gestimuleerd. Er is dan ook bekend, welke terreinen entomologisch belangrijk zijn, zodat er aan een eventuele bescherming kan worden gewerkt. Het risico, dat een lokale of zeldzame insectesoort door het bekend maken van de vindplaats(en) loopt om door onbeheerst wegvangen te worden uitgeroeid, kan men indien nodig nog opvangen door slechts in beperkte mate het vangen toe te staan en daarop bij de terreinbewaking toe te zien. Op Schouwen is het toezicht in dat opzicht in goede handen.

Summary

E. galiata is living in the Netherlands in the dune area in the south-west of the country. It is known from the dune area of Walcheren, but was never caught in great numbers.

During the entomological inventory of the dunes of the island of Schouwen large numbers of *E. galiata* have been observed, the optimal habitat being open spaces in the *Hippophae rhamnoides* shrubvegetations. The first generation was observed from 15 May—17 July, the second from 2 August—26 September.

Literatuur

- LEMPKE, B. J., 1950, Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 9: (700).
SOUTH, R., The British Moths, dl. 2.
-

Gluphisia crenata Esper (Lep., Notodontidae). Dordrecht is wel de oudste en tot nog toe de meest westelijke vindplaats in het Fluviatiel District. Kapelaan A. GROENENDIJK meldt me, dat hij er 21 juni 1961 weer een exemplaar ving, zodat de vlinder daar nog steeds blijkt voor te komen. Ook zo iets is tegenwoordig wel eens de moeite van het vermelden waard! — LPK.