

f. *griscens* nov. Grondkleur van de voorvleugels grijsbruin. Holotype: Bergeijk, ♂, 1.IX.1962.

Ground colour of the fore wings grey-brown.

Tholera cespitis Schiff., f. *clausa* nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels raken de eerste en de tweede dwarslijn elkaar aan de binnenrand. Holotype: ♂, Bergeijk, 30.VIII.1961.

The antemedian and the postmedian on the upper side of the fore wings touch each other at the inner margin.

Mythimna conigera Schiff., f. *semiconfluens* nov. De ronde vlek en de niervlek smal met elkaar verbonden. Holotype: Wijlre, ♂, 27.VIII.1945.

The orbicular and the reniform connected by a narrow isthmus.

Mythimna ferrago F. (*lythargyria* Esper), f. *striata* nov. Bovenzijde voorvleugels: de lichte middenstip staat in een zwartachtige streep, die zich wortelwaarts verder uitstrekt dan franjewaarts. Holotype: Aerdenhout, ♂, 9.VII.1960.

Upper side fore wings: the pale discal spot stands in a blackish line, which extends basad farther than distad.

Mythimna straminea Tr., f. *nigrolinea* nov. Van de bovenkant van de middencel loopt een zwarte streep naar de corresponderende zwarte stip van de postdiscale rij. Holotype: Aerdenhout, ♂, 8.VII.1952.

On the upper side of the fore wings is a black line from the upper side of the cell to the corresponding point of the postdiscal row.

Summary

I. Survey of the rarer or interesting Macrolepidoptera caught by the writer in 1962.

II. Enumeration of interesting forms.

III. Late dates observed in 1962.

IV. Descriptions of new forms.

Bergeijk, Bremdreef 2.

Een taaie *Noctua pronuba* (Lep., Noctuidae). Bij het nazien van de vangst uit een der vanglampen op Schouwen, welke in een verzendoosje tussen watten was verpakt, bleek één van de vele *pronuba*'s nog springlevend te zijn. Op zichzelf geen opzienbarend feit, er komen wel eens dieren bij, die niet lang genoeg in de cyaanpot hebben vertoeft. In dit geval echter was er sprake van een onbegrijpelijke levenskracht. De vangst werd nl. op 23 oktober ingepakt en door mij op 14 november nagezien! Dit dier had dus drie weken, zonder opname van vocht, tussen de watten gelegen en zich blijkens de zuiverheid ervan praktisch niet bewogen, het was een onbeschadigd wijfje! Na een behandeling met tetrachloorethaan en cyaankali en drie weken bewegingloos vasten nog zo monter te kunnen wegvliegen, is een opmerkelijke prestatie die te denken geeft!

W. J. BOER LEFFEF, Rijks Instituut Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (R.I.V.O.N.), Bilthoven.