

Literatuur

- BALACHOWSKY, A. S., 1953, Les Cochenilles de France, d'Europe, du Nord le l'Afrique et du Bassin Méditerranéen 7 : 115. Herman & Cie, Editeurs, Paris.
- CARON, J. R., 1951, *Bembecia hylaeiformis* Lasp., *Ent. Ber.* 13 : 224.
- COBBEN, R. H., 1958, Biotaxonomische Einzelheiten über Niederländische Wanzen (Hemiptera Heteroptera), *Tijdschr. Ent.* 101 : 1.
- ELTON, E. T. G., 1950, *Dendroctonus micans* Kugel., a pest of Sitka spruce in the Netherlands. *Proc. 8th Int. Congr. of Ent.*, Stockholm : 759—811.
- FRANSSSEN, C. J. H. & W. P. MANTEL, 1962, Lijst van in Nederland aangetroffen Thysanoptera met beknopte aantekeningen over hun levenswijze en hun betekenis voor onze cultuurgewassen. *Tijdschr. Ent.* 105 : 97—133.
- LEMPKE, B. J., 1938, Catalogus der Ned. Macrolepidoptera, *Tijdschr. Ent.* 81 : 300.
- , 1961, 8ste suppl., *Tijdschr. Ent.* 104 : 175.
- POL, P. H. VAN DE, 1946, *Bembecia hylaeiformis* Lasp., een weinig voorkomende beschadiger van de framboos (*Rubus idaeus* L.). *Tijdschr. Plantenz.* 52 : 25—27 (met 1 plaat).
- REYNE, A., 1957, Ned. schildluizen. *Wetensch. Med. kon. ned. natb. Ver.* 22 : 25.
- ROSSEM, G. VAN, 1955, Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten in het jaar 1954, *Ent. Ber.* 15 : 364.
- SOUTHWOOD, T. R. E. and D. LESTON, 1959, Land and water bugs of the British Isles : 184. Frederick Warne & Co. Ltd., London.

Goot, V. van der, Tweevleugelige Insekten-Diptera VII De Snavelvliegen (Rhagionidae), Viltvliegen (Therevidae), Mugvliegen (Cyrtidae) en Wolzwevers (Bombyliidae) van Nederland. Wetenschappelijke Mededeling no. 46 van de K.N.N.V., januari 1963.

In deze 19 pagina's tellende publicatie behandelt de schrijver op zijn bekende deskundige wijze de hierboven genoemde vliegenfamilies. Alle in ons land aangetroffen soorten zijn met de tabellen, die toegelicht worden door uitstekende figuren van de heer N. J. A. VISSER, te determineren.

Uit de vermelde vindplaatsen blijkt weer duidelijk, hoeveel faunistisch werk nog verricht moet worden vóór we werkelijk kunnen zeggen, dat we de verspreiding van de behandelde soorten in ons land inderdaad kennen. Slechts één enkele vondst, of geen enkele na 1900, komt men meermalen tegen. Voor amateurs, die in de regel de voornaamste leveranciers van faunistische gegevens zijn, is dan ook nog werk genoeg aan de winkel.

Weer een voortreffelijke aanwinst van de bekende K.N.N.V.-serie, die ook voor onze leden slechts f 1,75 kost. Het bedrag storten op postrekening 13028 van het bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud Nh., waarna franco toezending volgt. — Lpk.

Het voorkomen van *Thera juniperata* L. (Lep., Geometridae). Gedurende alle jaren dat ik te Raalte woon, blijkt *juniperata* in het najaar een gewone verschijning op licht te zijn. Nu staat hier en daar in de tuinen uit het wild meegenomen *Juniperus communis*, maar hierop vond ik de vlinder nooit. Op 17.X.1962 en enige dagen daarna vloog *juniperata* plotseling zeer talrijk in de mist om de lantaarnpalen. De herkomst van de dieren was toen snel gevonden. Ze bleken afkomstig te zijn uit gemeentelijke plantsoentjes. Hier staat veel gekweekte *Juniperus sabina* aangeplant, naar mij de gemeente-tuinman, de heer M. WINTERMAN, meedeelde. Van deze heesters waren ze 's avonds laat bij tientallen af te halen. Maar na enkele dagen was de vlucht ook even abrupt afgelopen en ik heb ze, ondanks goed observeren, niet meer gezien. Wel bleven ze op geschikte avonden in enkele exemplaren op de lamp thuis verschijnen. De opmerking in de Catalogus over het voorkomen op gekweekt materiaal in de duinstreek geldt dus ook voor Raalte. Over de herkomst van het Raalter plantmateriaal is merkwaardigerwijs niets bekend.

G. J. FLINT, Roggestraat 1b, Raalte.