

Vangsten van de Kleine Poppenrover, *Calosoma inquisitor* (L.) (Col.)

door

W. HELLINGA

De uitspraak van wijlen Dr. EVERTS, dat vele keversoorten niet zeldzaam zijn als wij maar weten waar en wanneer zij voorkomen en de juiste vangmethode kennen, gaat ook op voor de kleine poppenrover, *Calosoma inquisitor* (L.). EVERTS vermeldt in zijn werk, dat deze kever niet zeldzaam is in eikenbossen van Gelderland en Limburg. Toch hebben verzamelaars er maar weinig kunnen vangen en de meeste waren ongetwijfeld toevalligheidsvondsten.

Ik heb nu gelegenheid gehad het voorkomen van deze mooie kever te bestuderen op een terrein van slechts enkele hectaren groot in de buurt van Hoog-Soeren, waar enkele percelen eikehout voorkomen in stammen van ca. 30 cm diameter.

Met een grote regelmatigheid verschijnen de eerste exemplaren direct na het uitkomen van de bladeren en met het verschijnen van de eerste rupsen. De eerste dieren werden bemachtigd op 10 mei 1959, 11 mei 1960, 15 mei 1961 en (na het zeer koude voorjaar) 15 juni 1962.

In de daarop volgende twee weken kunnen ze bij honderden worden bemachtigd in het type en de aberraties: *viridimarginatum* Letzn., *coeruleum* Letzn., *nigrum* Letzn. en *cupreum* Motsch.

In 1960 ving ik tezamen met nu wijlen de heer P. VAN DER WIEL als nieuwe aberratie voor onze fauna de ab. *viridescens* Reitt. in een vijftal exemplaren.

Aangezien de dieren in de toppen der bomen voorkomen, zijn ze op het oog niet te vangen. Bij een flinke trap tegen de stam vallen ze echter naar beneden, waar ze zich pijsnel tussen de bladeren of het mos verschuilen en dan vrijwel niet meer te vinden zijn.

Tezelfdertijd kan men op deze manier ook vangen: *Elater cinnabarinus* Eschsch., een zeldzame kniptor, en *Xylodrepa quadripunctata* (L.), een mooie aaskeversoort.

Zodra de knoppen uitlopen is op deze wijze ook het kleine vliegend hert, *Systemocerus caraboides* (L.), in aantal te bemachtigen. Ook deze kever komt een tiental dagen voor, juist voordat de poppenrovers verschijnen.

Met deze ervaring, bij Apeldoorn opgedaan, heb ik *Calosoma inquisitor* ook zo gevangen nabij Arcen (L.), echter in veel kleiner aantal.

Summary

Calosoma inquisitor can easily be collected, with some aberrations, from oak trees in the woods of Hoog-Soeren near Apeldoorn, by kicking the trees, so that the beetles come falling down. Some other Coleoptera can be caught in the same way.

Amsterdam, Weesperzijde 23 II.