

Venema, Peter, Loopkever-tabel. Uitgave van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie; 32 pagina's, 52 figuren, 1962.

De schrijver geeft op originele en frisse wijze determinatietabellen voor bijna tweederde gedeelte van de inlandse Carabidenfauna, zodat wel gezegd kan worden, dat hiermee althans de meest voorkomende soorten op naam gebracht kunnen worden. Meer is er voor een werkje als dit niet nodig, het zal de belangstelling voor de loopkevers bij de jongeren zeker stimuleren en daarmee is de beoogde opzet bereikt. De onderscheidingskenmerken zijn kort geformuleerd, doch over het algemeen voldoende; de tekeningen zijn zeer duidelijk en zullen het moeilijke determineerwerk voor beginners zonder twijfel verlichten.

De schrijver zegt in zijn voorwoord getracht te hebben door het opnemen van zoveel mogelijk gegevens omtrent biotoop en gedragingen de belangstelling op iets anders te richten dan op „het verwenste soortenjagen”. Maar zijn degelijke determinatietabellen bewijzen, dat hij er zich van bewust geweest is dat soortenkennis voorafgaat aan alle verdere kennis, ook die omtrent biotoop en gedrag. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel „soortenjagen” heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt tot onze kennis van de biologie in de ruimste zin en niet te vergeten tot de in ons land wat achtergebleven faunistiek der kevers.

Moge deze prettig aandoende tabel enkele jongeren tot volbloed coleopterologen maken. — P. J. BRAKMAN.

*Laemophloeus alternans* Er. (Col., Cucujidae), nieuw voor de Nederlandse fauna. Op 26 maart 1963 kreeg ik uit een kweek, die bedoeld was om *Hypophloeus linearius* L. in handen te krijgen, vier stuks van bovengenoemde soort. Dr. BERGER te Eindhoven was zo vriendelijk de determinatie te bevestigen.

Daar ik mij de plaats, waar ik de dennetakjes verzameld had, nog herinnerde, heb ik daar op 12 april nog wat takjes gezocht en die thuis afgepeld. Hieruit kwamen nog vijf stuks van *alternans*. Tenslotte ving ik nog vijf op 18 april, zodat ik in totaal 14 stuks in handen kreeg. Bepaald zeldzaam blijkt de soort dus niet te zijn op de vindplaats.

De kever is 1,5—2,2 mm lang en zeer plat. Hij zit in de gangen van de schorskever, *Pityogenes bidentatus* Hrbst.

H. HEERKENS, Korvelseweg 253, Tilburg.

*Hybocampa milhauseri* F. (Lep., Notodontidae). Op 7.VI.1963 ving ik in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos een exemplaar van deze soort. De vlinder, die thuis hoort in bosachtige streken, is uit Amsterdam, voor zover ik weet, slechts éénmaal vermeld (5.VI.1915, VAN DER MEULEN), doch nog niet uit het Amsterdamse Bos.

De rups leeft op eik, iep, berk en populier.

M. P. PEERDEMAN, Westlandgracht 175 II, Amsterdam-Overtoomse Veld.

Afdeling Zuid-Holland. Biezonere omstandigheden voorbehouden zijn de vergaderingen als volgt vastgesteld: 30 oktober en 18 december in Hotel „Terminus”, Den Haag, 5 februari 1964 in Restaurant „Engels” te Rotterdam en op een nog nader te bepalen datum in april 1964 in het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, steeds des avonds om 8 uur. De leden in Zuid-Holland zullen nog een circulaire ontvangen.

I. A. KAIJADOE, Secretaris.

---