

- , 1959b, Les acariens psoriques parasites des chauves-souris VI. Le genre *Prosopodectes* Canestrini 1897 est composite et doit tomber en synonymie de *Notoedres* Railliet 1893. *Acarologia* 1 : 324—334.
- , 1959c, Les acariens psoriques parasites des chauves-souris XI. Le genre *Notoedres* Railliet 1893. *Rev. Zool. Bot. Africaines* 60 : 131—167.
- OUDEMANS, A. C., 1926, Étude du genre *Notoedres* Railliet 1893 et de l'espèce *Acarus bubulus* Oudms. 1926. *Arch. Néerl. Sc. Exactes*, s. 3B (Sc. Nat.), 4 : 145—262.
- VITZTHUM, H. Graf, 1932, Der Erreger der "Rüsselbildung" bei *Myotis nigricans* Wied. *Zeitschr. Parasitenk.* 4 : 400—406.

Ontvetten. De meest gebruikte middelen hiervoor zijn thans wel wasbenzine en trichlooraethyleen. Zo lang alleen het lichaam (en dan vooral het abdomen) vervet is, voldoen ze wel. Al moet de trichloor wel volkomen zuiver zijn, anders worden de kleuren soms sterk aangetaast. Zijn de vleugels echter ook min of meer vervet, dan lukt het bijna nooit een vlinder weer tot zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Bovendien plakken de haren van het lichaam en de franje vaak sterk aan elkaar en men kan later niet altijd dit euvel weer met een zacht penseel geheel verhelpen.

De heer CARON past een ander procédé toe, dat ik uit eigen ervaring zeer kan aanbevelen. De vlinder gaat eerst een dag in benzol en wordt dan nat en wel onmiddellijk in een bakje met magnesiumpoeder gelegd en geheel met deze stof bedekt, zodat alleen de punt van de speld er boven uit steekt. Ook daarin blijft het exemplaar een volle dag. Het resultaat is tot nog toe verbluffend. Een ♂ van *Hepialus humuli*, waarvan de vleugels al grotendeels vervet waren, werd weer even prachtig wit als toen het vers was. Kleuren worden niet aangetast, zelfs niet het tere groen. Ik heb het geprobeerd met *Calamia widens* (*virens*) en *Geometra papilionaria*, beide beruchte verkleurders en vervetters. Ze waren na de behandeling „als nieuw". De franje kleeft nauwelijks aan elkaar en is zo nodig met een zacht penseel weer gemakkelijk in de goede stand te strijken. Ook het overtollige poeder verwijdert men zo. Het gelukte me alleen niet oude *Harpyia's* (60 jaar en meer) uit de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam, die door het vervetten al jaren geleden geel geworden waren, weer mooi wit te doen worden. Wel exemplaren, die een jaar of 20 geleden gevangen waren.

Benzol en magnesiumpoeder zijn goedkope artikelen, die elke drogist kan leveren. De benzol kan gebruikt worden tot ze geel gaat worden, dus te veel vet opgenomen heeft. Dan moet ze beslist vernieuwd worden. Het poeder lijkt onbeperkt mee te gaan.

In geen geval twee of meer vlinders tegelijk los in het bad! De vleugels worden namelijk zeer bros, zodat ze onmiddellijk sterk beschadigen, als twee exemplaren door schudden tegen elkaar stoten. Na het drogen hebben ze echter weer hun normale hardheid.

Overigens dreigt bij het uit de vloeistof halen van teergebouwde soorten hetzelfde gevaar als bij de andere vloeistoffen, het oprollen van de achtervleugels van de binnenrand naar het midden. Dit gebeurde me bij een *Scopula imitaria* met sterk vervet achterlijf. Bij dergelijke dieren pas ik nu een andere methode toe. Ik vul de gleuf van het opzetblokje geheel met poeder en bedek er ook het hout mee. Dan maak ik in het poeder van de gleuf een klein richeltje waarin het abdomen past, steek de vlinder in het blokje tot op het poeder en bevochtig nu het achterlijf met een penseel flink met benzol. Dan onmiddellijk de hele vlinder goed bedekken met poeder en na een dag is het euvel meestal verholpen. Zo niet, dan herhalen. De achtervleugels blijven nu goed in de vorm, ook al worden ze vochtig.

Ook andere insecten dan vlinders zullen wel op een van beide manieren behandeld kunnen worden. Denk er echter wel om, dat benzol zeer brandbaar is. — LPK.

Trekvlinders in 1962. Bij *Mythimna l. album* L. is een van de interessantste vangsten vergeten, nl. een exemplaar op 4 oktober te Bussum door de heer TER LAAG. Het is wel meegerekend bij het jaartotaal.

Op pag. 185, regel 11 van boven, moet 30.VII zijn: 30.VIII. — LPK.