

- STEEL, W. O., 1950, A note on the nomenclature of the British and continental Staphylinid (Col.) hitherto known as *Xantholinus meridionalis* Nordm. — *Ent. mon. Mag.* 86 : 140—141.
- STENIUS, G., 1952, Paläarktische Arten aus der Gruppe *Scymnus* (*Nephus*) *bipunctatus* Kugel. (Col., Coccinellidae). — *Notulae ent.* 32 : 147—155.
- TOTTENHAM, C. E., 1948, A revision of the British species of *Arphirus* Tottenham (subgenus of *Quedius* Stephens) (Col., Staphylinidae). — *Ent. mon. Mag.* 84 : 241—258.
- , 1950, *Metopsia gallica* (Koch) (Col., Staphylinidae) in Britain. — *Ent. mon. Mag.* 86 : 81.
- WEISE, E., 1956, *Platycerus caprea* De Geer. — *Ent. Blätter* 52 : 54—58.
- , 1960, Die paläarktischen Arten der Gattung *Platycerus* Fourcr. — *Ent. Blätter* 56 : 133—149.
- WIDENFALK, T., 1956, *Synchita separanda* Reitt., en från *S. humeralis* F. väl skild art, funnen i Sverige (Col. Colydiidae). — *Ent. Tidskr.* 77 : 77—78.
- WÜSTHOFF, W., 1942, Die Forcipes der mir bisher bekannt gewordenen Arten der Gattung *Lathrobium* (Col. Staph.). — *Mitt. Münch. ent. Ges.* 32 : 582—596.
- Nieuw- en Sint Joosland, Wilhelminastraat 21.

Insecten uit aangespoeld hout. De heer R. OKKER verzamelde in augustus 1960 levende insecten uit een op het strand van Terschelling aangespoelde balk.

Het hout bleek te behoren tot een Sterculiacee (det. A. T. J. BIANCHI, Amsterdam); de kevers konden met hulp van Dr. L. G. E. KALSHOVEN (Blaricum) en het Commonwealth Institute of Entomology (Londen) worden gedetermineerd als:

*Airora longicollis* Guér., 1 ex.

*Brenthus anchorago* L., 4 ♀, 4 ♂.

*Brenthus armiger* Hbst., 1 ♀.

*Brenthus* spec., 1 pop, 2 larven.

*Cossonus* spec., 1 ex.


Platypodidae, gangen in hout (fig. c), popcellen (fig. a), losse tibia.

*Xyleborus ferrugineus* F., gangen in hout (fig. b), losse elytra.

?Cerambycidae, gangen in hout (fig. d).

Elateridae, 2 larven.

onbekende boorder, gangen in hout (fig. e).



Bij de zending bevonden zich ook twee vliegenlarven.

Aan de bevolking te zien, is het stuk hout afkomstig uit Zuid-Amerika. Het is waarschijnlijk op een schip als stuwhout gebruikt, en dicht onder onze kust over boord gezet.

J. T. WIEBES, Rijks Museum van Natuurlijke Historie, Leiden.