

Earophila badiata Schiff. (Lep., Geometridae) op verscheidene plaatsen in Zuid Limburg

door

W. J. BOER LEFFEF

(Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het
Natuurbehoud (R.I.V.O.N.))

Earophila badiata komt in het zuiden van ons land stellig meer verspreid voor dan tot nu toe bekend was. Reeds bij enkele incidentele inventarisaties werden een drietal vindplaatsen gevonden, welke nog niet uit de literatuur bekend waren.

De soort werd nl. aangetroffen bij Cadier-Keer op een kalkgrashelling met een rijke rozenvegetatie (o.a. *Rosa dumetorum*), in het Vijlenerbos te Vaals, en te Gronsveld bij het Savelsbos. De bekende vindplaatsen zijn Kerkrade, Wijlre, Valkenburg, Houthem, Lemiers en elders in Vaals.

Rozen vindt men in Zuid Limburg practisch overal langs de wegen in de wegbermen aan bosranden, langs holle wegen, in heggen en in ruigten, op kalkgrashellingen. *E. badiata* zal daarom een groter verspreiding in dat gebied hebben dan werd verondersteld. Door het meer en meer toepassen van herbiciden voor het onderhoud van holle wegen, wegbermen e.d., wordt deze soort evenwel bedreigd. Het is daarom niet onmogelijk, dat er voor *badiata* nog eens wegbermreservaten moeten worden gesticht. Dat zou ook voor andere organismen nuttig zijn. Er zijn al zo vele waardevolle vlindersoorten, die juist daar hun optimum biotoop hebben.

Summary

Three new localities for *Earophila badiata* Schiff. in the south of Dutch Limburg.

Copula van gekweekte *Thersamonina dispar* Haworth (Lep., Lycaenidae). Het is mij voor het eerst gelukt bevruchte eitjes te krijgen van *dispar*, die uit het ei werd opgekweekt. De eitjes, afkomstig van N.W.-Overijssel, werden 1 augustus verzameld en overgebracht op zuringplanten in mijn tuin te Geffen. De vlinders kwamen vroeger uit de pop dan in hun geboortestreek. De data zijn voor 1959: 17 juni tot 7 juli en voor 1960: 16 juni tot 14 juli.

De dieren moeten buiten gecopuleerd hebben, want de verkregen eitjes kwamen 23 juli 1960 uit. Ik hoop, dat enkele rupsen nog dit jaar zullen doorgroeien en de vlinder leveren, zoals wel eens voorkomt. De wijfjes leggen nogal wat eitjes. Een geïsoleerd exemplaar produceerde van 3 tot 22 augustus in totaal 517 stuks.

V. GERRIS, Dorpsstraat 6, Geffen-N.B.

Coleopteroloog gezocht. GOECKE & EVERS, Krefeld, Dürerstraße 13, West-Duitsland, zoeken jong entomoloog voor hun collecties Coleoptera. Aangename werkkring, hoofdzakelijk bestaande uit prepareren, determineren, collecties ordenen, bibliotheek in stand houden. Desgewenst ook inschakeling in onze uitgeverij (zoölogie-entomologie). Wij zijn behulpzaam bij het zoeken van een woning of kamer.