

breit, der äußere beinahe halbkreisförmig, die Seitenfortsätze enden winkelig und sind etwas länger als beim Weibchen.

Allotype im Zoologischen Museum in Amsterdam. Fundort: Sumatra, Tanangtalu, V.1915, Edw. JACOBSON.

Ein mit der Type übereinstimmendes Weibchen befindet sich im Museum Leiden und stammt aus Sumatra: Tambang Sawah, Benkoelen, 1929, E. A. DOUGLAS.

Ein anderes übereinstimmendes Weibchen aus Sumatra, Gun. Teleman, VI.1917, Edw. JACOBSON ist in der Sammlung des Zoologischen Museums Amsterdam, jedoch ist die Innenbürste des nach oben verlängerten Fühlerschaftes nicht so dicht behaart. Das dazugehörige Männchen in Sammlung SCHEDL zeigt alle Merkmale des oben beschriebenen Männchens, nur fehlen auf dem Halsschild die Rudimente der vier quergestellten Poren und auf dem Absturz ist der fünfte Zwischenraum ähnlich ausgebildet wie der dritte. Es wird sich erst später herausstellen, ob diese geringfügige Abweichung als Variation oder Unterart gedeutet werden kann.

#### *Diapus minor* Schedl fem. nov.

Weibchen 1,9 mm lang, 4 mal so lang wie breit. Dem Weibchen von *D. pusillimus* Chap. sehr ähnlich, nur etwas schlanker, was besonders auf den Flügeldecken zum Ausdruck kommt. Die Stirn stark abgeflacht, winzig punktuliert, am Rande mit kurzen abstehenden Härchen. Scheitel wie bei der verwandten Art mit drei Längskielen. Halsschild wie beim Männchen. Flügeldecken schlank walzenförmig, hinten jede Flügeldecke für sich ganz kurz und stumpf gerundet, eine Absturzwölbung wie bei *D. pusillimus* nur angedeutet, die Scheibe fein in Reihen punktiert, auf der Absturzwölbung die Punkte kaum wahrnehmbar, dafür etwas rugos.

Allotype im Museum Leiden, Paratype in Sammlung SCHEDL. Fundort: Java: Mt. Gedé, 800 m, XI.1924, L. G. E. KALSHOVEN.



Kleine coleopterologische aantekeningen. *Leistus rufomarginatus* Dfts. Volgens Coleoptera Nederlandica 3 (ik bezit geen recenter gegevens) uit Gelderland, Utrecht, het Gooi, Brabant en Overijssel opgegeven. Ik ving een exemplaar in Veenhuizen, IV.1945.

*Notiophilus pusillus* Waterh. 1 exemplaar, Wageningse Eng, 1958, tussen aarde onder planten.

*Dyschirius lüdersi* Hans Wagner. 1 exemplaar, Driel, VIII.1947. Op klei van de Rijn-oever.

*Bembidium nigricorne* Gylh. Komt ook in Drenthe voor. Ik vond de soort in Veenhuizen, V.1945.

*Onthophagus fracticornis* Preyssl., form. *marginatus* Muls., te Veenhuizen, lente 1945.  
*Onthophagus coenobita* Hrbst. Leeft niet alleen in aas en mest; ik vond tenminste drie exemplaren in een sterk rottende paddestoel, juni, Oldenzaal.

*Aphodius prodomus* Brahm, f. *semipellitus* Solsky (faun. nov. form.). Een mannetje te Veenhuizen, 1945. De top van de clypeus vertoont aan weerszijden een rode plek.

F. C. F. STERRENBURG, Da Costastraat 74, Alphen a/d Rijn.