

wijze van de larven is geheel anders dan die van de zweefvlieg-larven: het zijn endoparasieten van de kleine springcicaden, waar de ♀ vliegen waarschijnlijk naar zoeken als ze statig tussen de takken en bladeren door laveren. Evenwel laten de ♂♂ hetzelfde gedrag zien en het is merkwaardig, dat ze dan voorkeur voor bepaalde struiken kunnen vertonen. Zo verzamelde ik op 9 mei 1960 in het Heilooër bos in nog geen uur tijd 17 ♂♂ (geen ♀♀) van *Dorylas furcatus* in een klein meidoornstruikje. Hierin zag ik springcicaden. Er vlogen ook enkele vliegjes in een nog kleiner struikje op enkele meters afstand. Langs hetzelfde bospad stond dertig meter verderop een grote meidoornstruik, die echter volkomen Dorylaidenloos was. Het verzamelen van een dergelijke grote serie is echter een unicum.

Summary

Dorylas ater Mg., *D. thomsoni* Becker, *Chalarus holosericeus* Mg. and *Verralia pilosa* Zett. (Dorylaidae, Dipt.) are new to the Dutch fauna. *D. campestris* Latr. must to be struck off the Dutch list. In the author's collection there is also the hitherto unknown ♀ of *D. perspicuus* de Meij., from marshes near Ankeveen, 20 km SE of Amsterdam, 15.VI.1950. This specimen has the same characters as SACK (LINDNER) used for the ♂ in his key, but the yellow coloured parts on the abdomen are restricted to the sides of segments 3 and 4.

Literatuur

- COBBEN, R. H., 1956, Voorlopige mededeling over enkele cicaden-parasieten, *Ent. Ber.* 16 : 160—165.
- MEIJERE, J. C. H. DE, 1939, Naamlijst van Nederlandsche Diptera, *Tijdschr. Ent.* 82 : 156.
- SACK, P., 1935, Dorylaidae, in LINDNER: Fliegen der palaearktischen Region 93, Stuttgart.
- WULP, F. M. VAN DER en J. C. H. DE MEIJERE, 1898, Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera, *Tijdschr. Ent.* 41 (bijvoegsel): 62.

Amsterdam-W., Slotermeerlaan 157hs.

Doratifera oxlei Newman (Lep., Limacodidae). Bij het doorzien van de collectie van de heer F. J. VAN DER AA te Rotterdam trof ik daarin een vlinder aan, die voor de bezitter een probleem vormde en het voor mij eveneens werd. Naar de habitus en de vliegtijd te oordelen kwam nog het meest het geslacht *Eriogaster* in aanmerking, maar er waren te veel verschillen in kleur en tekening met de bekende soorten. Toen ik het exemplaar thuis nauwkeuriger kon bekijken, bleek bovendien het aderstelsel niet te kloppen. Ik kon echter niets vinden, wat ook maar in de verte met het dier overeenstemde.

Ik zond het daarom naar de Zoologische Staatssammlung te München, waar men de beschikking heeft over uitgebreide buitenlandse collecties. Na enige moeite gelukte het de heer F. DANIEL de vlinder te determineren als *Doratifera oxlei*, een soort, die thuis hoort in Australië. Het exemplaar werd gevangen te Doorn op 9 mei 1959. Het is een ♀ in nog vrij goede toestand. Natuurlijk is deze soort bij ons een adventief. De meest waarschijnlijke manier, waarop de vlinder levend en wel in Nederland is aangekomen, is wel per vliegtuig. In elk geval is het wel een zeldzaam gelukkig toeval, dat deze rariteit ook nog in handen viel van een verzamelaar! — LPK.

Verzoek. Wie kan mij helpen aan *Acherontia atropos* L. tegen goed materiaal?

C. NIES, Martinetstraat 26, Deurne.