

Bijzondere Lepidoptera en een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna

door

G. A. BENTINCK

Op de 93e Wintervergadering van 26 februari 1961 demonstreerde ik de volgende Lepidoptera, waaronder één nieuwe soort voor onze fauna:

I. Macrolepidoptera:

1. Een ♀ exemplaar van *Poecilocampa populi* L. op 25 oktober 1960 te Amerongen gevangen.
2. Een exemplaar van *Amathes sexstrigata* Hw. (*umbrosa* Hb.); een van *Celaena leucostigma* Hb., f. *intermedia-flavo* Tutt; en een van *Luperina testacea* Schiff., f. *nigrescens* Tutt, alle drie op 28 augustus 1960 te Amerongen gevangen.
3. Drie exemplaren van *Mythimna l-album* L., op 12, 13 en 24 september 1960 te Amerongen gevangen.
4. Drie exemplaren van *Arenostola pygmina* Hw. (*fulva* Hb.), eind aug. en sept. 1960 te Amerongen gevangen.
5. Een exemplaar van *Cirrhia ocellaris* Bkh., op 22 september 1960 te Amerongen gevangen.
6. Een exemplaar van *Schrankia costaestrigalis* Stph., op 28 augustus 1960 te Amerongen gevangen.
7. Een exemplaar van *Parascotia fuliginaria* L., op 3 augustus 1960 te Amerongen gevangen.
8. Enige exemplaren van *Hydrelia flammeolaria* Hufn. (*luteata* Schiff.) op 17 en 18 juni 1960 te Denekamp gevangen.
9. Een exemplaar van *Coenotephria sagittata* F. en een van *Anticollix sparsata* Tr., beide op 18 juni 1960 te Denekamp gevangen.

II. Microlepidoptera:

1. Een exemplaar van *Myelois ceratoniae* Z. op 29 mei 1960 te Amerongen gevangen, nieuw voor de Nederlandse fauna (zie: *Proc. Zool. Soc. London* 113 (3). 68 en 87, Plaat III, fig. 18; en pag. 71 voor tekening aderstelsel, 1943). De soort leeft als rups o.a. in okkernoten, welke bomen voorkomen dicht bij de plaats waar dit exemplaar gevangen werd.
2. Een exemplaar van *Cnephasia communana* H.S., op 26 juni 1958 in het Natuurreservaat Molenven gevangen. Deze soort, tot nog toe weinig waargenomen, moet beslist meer voorkomen, vliegt vroeger dan *Cn. chrysanthæana* Dup., en de voorvleugels zijn puntiger.
3. Een exemplaar van *Epiblema pflugiana* Hw., op 26 aug. 1960 te Amerongen gevangen.
4. Een exemplaar van *Epiblema trigeninana* Stph., een van *Olethreutes bifasciana* Hw. en een van *Eidophasia messingiella* F.R., alle op 18 juni 1960 te Denekamp gevangen.
5. Een exemplaar van *Cerrostoma scabrella* L., op 29 juli 1960 te Meerssen gevangen.

6. Een exemplaar van *Psoricoptera gibbosella* Z., op 11 sept. 1960; een van *Gelechia scalella* Sc. op 16 mei 1960; en een van *Gelechia mulinella* Z. op 3 aug. 1960, alle drie te Amerongen gevangen.

7. Een exemplaar van *Gelechia obsoletella* F.R., op 19 juli 1934 te Amsterdam gevangen (in mijn collectie destijds verkeerd gedetermineerd). Dit is het tweede inlandse exemplaar. Het eerste ving ik op 26 juni 1957 op Terschelling.

8. Een exemplaar van *Xystophora lutulentella* Z., op 5 juni 1960 te Amerongen gevangen.

9. Een exemplaar van *Rhinosia formosella* Hb., op 29 juli 1960 te Meerssen gevangen.

10. Een exemplaar van *Coleoptera prunifoliae* Doets, op 3 aug. 1960 te Amerongen gevangen.

Summary

Rarer and more local species of Lepidoptera, taken in different localities in the Netherlands in 1960. *Myeolois ceratoniae* Z. is new to the Dutch fauna.

Amsterdam-Z. 1, Saxen Weimarlaan 22.

Macrolepidoptera in 1960

door

T. H. VAN WISSELINGH

Zoals steeds wil ik u weer een kort overzicht geven van de belangrijkste vangstem in het afgelopen vangseizoen (1960). De eerste helft van 1960 was, wat betreft het aantal waargenomen soorten, vrij normaal. Dit aantal soorten schommelde tot 15 juni ongeveer om het gemiddelde van de jaren 1946—1956; op 1 juli lag het daar zelfs belangrijk boven, nl. 288 tegen 245 gemiddeld (hoogste aantal in 1952, nl. 302). Daarna was de vangst veel slechter, zodat het in 1960 totale aantal waargenomen soorten beneden het gemiddelde van de jaren 1946—1956 bleef, nl. 435 tegen 450 gemiddeld.

Zeldzame in 1960 waargenomen soorten:

Eupithecia venosata F. Van deze soort, welke tot nu toe alleen uit Zuid-Limburg bekend is, ving ik op 14 juni een exemplaar op licht te Aerdenhout. Ik heb mij bij deze vangst afgevraagd, of het mogelijk zou kunnen zijn, dat ik deze soort zelf in Aerdenhout had geïmporteerd, doordat ik vele jaren zaaddozen van de witte silene waarin de rups leeft en vaak verpopt, uit Zuid-Limburg heb meegebracht en na het uitzoeken in mijn tuin heb gedeponneerd, zodat daar vrij grote oppervlakten met de voedselplant zijn begroeid. Hiertegen pleit, dat ik in 1959 geen zaaddozen uit Limburg heb meegebracht, zodat indien ik zelf een popje in mijn tuin zou hebben gebracht, de soort minstens 2 jaar in Aerdenhout zou hebben standgehouden. Voorts wijkt het gevangen exemplaar van de Zuid-Limburgse af, doordat de zwarte lijnen veel smaller zijn en zelfs gedeeltelijk ontbreken.