

Bijzondere Lepidoptera

door

G. DIJKSTRA HZN.

Op de 93e wintervergadering demonstreerde ik de volgende Microlepidoptera:

1. *Aphomia gularis* Z. Een exemplaar, gevangen te Leeuwarden op 10 juli 1959. Dit ex. zat in de tuin tegen de buitenmuur van de garage, in de schaduw. Deze soort werd door Dr. A. DIAKONOFF in november 1936 in een pakhuis van gedroogde zuidvruchten te Amsterdam ontdekt (*Tijdschr. Entom.* 81: LI). Dit is het eerste in de vrije natuur aangetroffen exemplaar.

2. *Olethreutes tiedemanniana* Z. Een exemplaar, gevangen te Wolvega 22 juni 1959. Dit is het tweede uit ons land bekende exemplaar. Het eerste werd door Dr. LYCKLAMA à NIJEHOLT te Nijmegen bemachtigd. Zie *Tijdschr. Entom.* 78: XXIII, 79: 201, 207—208.

3. *Olethreutes bifasciana* Hw. Een exemplaar, gevangen te Beetsterzwaag op 5 juni 1959.

4. *Acleris shepherdana* Stph. Een exemplaar gevangen te Eernewoude op 9 september 1955. Het eerste uit ons land bekende exemplaar werd gevangen te Kortenhoef op 9 augustus 1939; het tweede eerst op 17 augustus 1947, eveneens aldaar. Zie *Tijdschr. Entom.* 91: XX. Daarna zijn er nog slechts enkele gevangen; zeer zeldzaam.

5. *Acleris lorquiniana* Dup. Een exemplaar, gevangen te Wolvega op 11 juli 1958. Deze soort werd door Ir. G. A. Graaf BENTINCK als nieuw voor de Nederlandse fauna vermeld op de 82e Wintervergadering te Leiden (*Tijdschr. Entom.* 94: XV).

6. *Steganoptycha rubiginosana* H. S. Door mij werden op 20 juni 1958 twee exemplaren op Vlieland gevangen, waarvan ter vergadering één getoond werd.

7. *Depressaria flavella* Hb. Een exemplaar te Wolvega gevangen op 13 juli 1960. Ook op 11 juli 1958 werd aldaar een exemplaar bemachtigd.

Tenslotte dank ik de heer BENTINCK nogmaals voor zijn hulp bij het op naam brengen van deze vlinders.

Summary

Some rarer Microlepidoptera, taken in the province of Friesland.

Leeuwarden, Gerard Terborgstraat 7.

Hydraecia petasitis Doubleday (Lep., Noctuidae). In *Ent. Z. Frankfurt* 71: 165 (1961) schrijft R. HINZ, dat de jonge rupsen makkelijk te vinden zijn door op de bloeistengels van Groot Hoefblad (*Petasitis*) te letten. Van half tot eind mei bevinden de dieren zich in deze stengels, die niet moeilijk te herkennen zijn, doordat zulke stengels vroegtijdig verwelken. De jonge rupsen zijn makkelijk verder te kweken met bladstengels van de voedselplant, doch moeten afzonderlijk gehouden worden, daar ze zich in gevangenschap als moordrupsen gedragen. De volwassen rupsen zijn van half juni tot in augustus in de wortelstokken te vinden. — LPK.