

Enkele coleopterologische Notities

door

R. BOUWER

Agonum livens Gylh., Bekendelle, 3.VIII.1956, 1 exemplaar, L. HARTSUYKER leg. Deze soort is in ons land weinig verzameld.

Bryocharis cingulatus Mnnh., Ahlde (Westfalen), 23.IV.1954, 1 exemplaar. In Duitsland niet algemeen, in Nederland tamelijk verbreid en zeer zeldzaam.

Bryocharis inclinans Grav., Bentheim (Westfalen), 5.VIII.1958, 1 exemplaar. Als de vorige, in Nederland weinig aangetroffen.

Philonthus nitidus F., Ommen, 23.VII.1956, twee exemplaren. In de Bijdrage tot de kennis der Nederlandse kevers, IV, wordt de soort voor het eerst door P. VAN DER WIEL als inlands opgegeven (Dwingelo, 1.VII.1942; POST leg.). Eveneens door A. C. NONNEKENS bij Gorssel gevangen (17.VIII.1956, 1 ex.; Ent. Ber. 17 : 1957). De kever komt voornamelijk in bergstreken voor.

Euplectus falsus Bedel (*intermedius* Rtt., non Woll.), Den Haag, 12.X.1957. Van deze soort zeefde ik 12 exemplaren uit boommoolm uit het Haagse bos. De kever staat als uiterst zeldzaam te boek (EVERTS).

Liodes rubiginosa Schm. a.c. *dilatocollis* Fl., Terschelling, 22.VIII.1956, 1 exemplaar. Lokaal, niet algemeen.

Scaphosoma boleti Panz., Den Haag, 8.II.1958. Van deze zeldzame soort zeefde ik twee exemplaren uit bladaarde uit het Haagse bos.

Teredus cylindricus Oliv., Faun. nov. spec. Den Haag (Haagse bos), 6.III.1954, één exemplaar. Deze Colydiide is in heel Europa zeldzaam. Ik noem hier de volgende vindplaatsen. Engeland: Berks, Notts, Sherwood Forest; Duitsland: Rijnland, Westfalen (Bückerburg en Arnsberg), Hessen, Baden, Frankenland, Beieren, Kassel, Thüringen; Oostenrijk: Karinthië; Zwitserland: Kt. Tessino (in Tesserete werden door de heer VAN DER WIEL 4 exemplaren achter schors van een boomstomp van een Tamme kastanje verzameld). *T. cylindricus* is een parasiet van schorskevers; wordt ook achter beukeschors gevonden.

Scaphidema metallicum F. a.c. *bicolor* Redt., Rijswijk (Z-H), 30.IV.1958. 1 exemplaar. Niet algemeen.

Allecula morio F., Winterswijk, 16.VIII.1958, één ♀; R. DE JONG leg. Verbreid, voornamelijk in het oosten des lands; niet algemeen.

Phloeotrya vaudoueri Muls., Winterswijk, 28.VIII.1958, één ♂, R. DE JONG leg. De kever werd in gezelschap van *Hyliota planata* L. en *Silvanus unidentatus* F. achter eikeschors aangetroffen. *P. vaudoueri* is niet algemeen.

Xyleborus eurygraphus Ratz., Voorburg, 20.IV.1958, één ♀. Deze Scolytide, die in het Middellandse-Zeegebied thuis hoort, waar hij op allerlei dennesoorten leeft, werd in een sinaasappel gevonden. Reeds eerder door wijlen Dr. VAN DER WEELE in een mandarijn-sinaasappel te Den Haag aangetroffen (Col. Neerl. 3 : 647).

Sommige der bovengenoemde kevers werden door de heer VAN DER WIEL gedetermineerd, of anders de determinatie gecontroleerd, waarvoor mijn hartelijke dank.

Zusammenfassung

Zwölf nicht allgemeine Käfer, wovon zwei aus Westfalen, sowie auch eine neue Art für unsere Fauna (*Teredus cylindricus* Oliv.), werden genannt.

Rijswijk (Z-H), Galjoenstraat 41.

Zimmerman, Elwood C., *Insects of Hawaii*. Volume 8. Lepidoptera: Pyraloidea. University of Hawaii Press, Honolulu, 1958. XII + 456 pp., 347 illustrations in text. Price \$ 8.00.

Hardly was the publication announced of the seventh volume of this handbook (in *Ent. Ber.* 19: 191), when the eighth volume appeared.

The series has a sub-title which amply explains its scope; it runs as follows: "A Manual of the Insects of the Hawaiian Islands, including an Enumeration of the Species and Notes on their Origin, Distribution, Hosts, Parasites, etc."

The eighth volume is entirely in accordance with the preceding. After a "Checklist", a "Summary of nomenclatorial changes", which again is extensive, the author treats, in the special part, the families Pyralidae, Pterophoridae and Alucitidae, followed by an extensive list of literature.

This volume is also richly illustrated with excellent enlarged photographs of the adults and the genitalia. Keys to genera and species; short remarks on distribution, food plants and parasites comprise the special part.

A novelty is the use of the family name Alucitidae for the group, usually known under the name Orneodidae Meyrick 1895. This is in accordance with a recent decision of the International Commission on Zoological Nomenclature. This use is unavoidable after the validation by the Commission of LINNÉ's generic name *Alucita* with the type of the genus *pentadactyla*, the common European species. The validation of this and other generic names of LINNAEUS is excellent and puts an end to much confusion. However, the necessity to reject the well-established family name Orneodidae is regretful in a way.

In spite of this quite modern change of the family name, the genus *Orneodes* is treated in the present handbook together with Pterophoridae which is a rather old-fashioned practice. The relation of *Orneodes* with Pterophoridae is based on superficial resemblance only and is not in agreement with the characters of internal structure, as e.g., the genitalia. I would prefer the arrangement of this isolated and peculiar family (Alucitidae) somewhere in the vicinity of the superfamily Gelechioidea.

There is only a single representative of the family in Hawaii, one of the immense, compound genus *Orneodes*.

Further interesting news is to be found under the heading Pterophoridae, where the author introduces (the long-needed!) revolutionary changes in the generic nomenclature, proposing not less than four new genera — out of the five genera known to occur in Hawaii!

With great interest we are looking forward to the appearance of the following, ninth volume, entirely dedicated to the Microlepidoptera proper. — A. DIAKONOFF.

Papilio machaon L. Nog een opmerking over het veel zeldzamer voorkomen van de Koninginnepage. De heer J. ROOSE te Koudekerke op Walcheren schreef me dezer dagen: „Vroeger kwam de rups hier tamelijk veelvuldig voor. De laatste drie jaar zien we er geen een meer, in geen enkel tuintje. Hoe is dit verschijnsel te verklaren?" Ja, wisten we dat maar! We weten niet eens, onder welke ecologische omstandigheden deze soort het beste floreert en in die richting zal toch wel de oplossing van de puzzle gezocht moeten worden. — LPK.