

- Official list of generic names in zoology, first instalment, 1958.  
 Official index of rejected and invalid family-group names in zoology, first instalment, 1958;  
 Official list of family-group names in zoology, first instalment, 1958.  
 SABROSKY, C. W., 1939, A summary of family nomenclature in the order Diptera. — *Verb. VII. Intern. Kongr. Entom. Berlin, 1938*, 1 : 599—612.  
 ———, 1952, Meigen, 1800: a proposal for stability and uniformity. — *Bull. Zool. Nomencl.* 6 : 131—141.

De donkere vorm van *Apatete tridens* Schiff. (Lep., Noctuida). In *Ent. Ber.* 19 : 71—74 (1959) vermeldde ik het eerste exemplaar hiervan, dat de heer BOGAARD in 1958 te Hendrik-Ido-Ambacht gevangen had. Aan het slot van het artikel schreef ik, dat van een snelle uitbreiding van deze vorm op dat ogenblik nog niets bleek. Nu, nauwelijks een jaar later, ben ik er al van overtuigd, dat de donkere *tridens* zich even snel onder de soort verbreidt als dat bij *Apatete psi* gebeurd moet zijn. Ik heb al exemplaren gezien uit Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland en bovendien nog van een andere vindplaats in Zuid-Holland. Soms kan ik zo wel zien, of ik met een donkere *psi* of een donkere *tridens* te doen heb, maar vaak is het onmogelijk zonder genitaal-onderzoek met zekerheid de soort te determineren. Helaas kan dat alleen bij de mannetjes.

Het is natuurlijk zeer interessant, dat we nu precies weten, wanneer het eerste exemplaar in ons land werd aangetroffen en dat we de verspreiding van de vorm kunnen volgen. Ik zou het daarom bijzonder op prijs stellen, als iedere verzamelaar zoveel mogelijk op deze donkere vormen wil letten. Probeer van donkere wijfjes eieren te krijgen, zodat we de beschikking krijgen over met zekerheid determineerbare donkere exemplaren van dat geslacht. Kweek ook alle rupsen op, die u van de twee soorten vindt, maar houd ze apart en schrijft later op het etiket niet alleen vindplaats en datum, maar ook de naam van de soort. Dat bespaart heel wat werk. — LPK.

Rupsen van *Ectropis bistortata* Goeze schadelijk op *larix* (Lep., Geom.). In de boswachterij Grollo werden in 1959 verschillende *larix*-percelen kaalgevreten door spanner-rupsen. De soort werd niet herkend. Uit een mij toegezonden partij poppen kwamen eind 1959 en begin 1960 (door forceren) verscheidene imagines, welke tot de zo gewone *Ectropis bistortata* bleken te behoren.

Voor zover ik weet is dit de eerste maal, dat deze soort in ons land schadelijk geworden is. In Duitsland was dit reeds jaren bekend. Hoewel de rups polyfaag is, zou toch eerder een schadelijk optreden in loofhout te verwachten zijn. Uit de poppen kwamen nogal wat parasieten. Afwachten dus, of de plaag zich in 1960 zal herhalen.

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn (Med. R. I. V. O. N.).

*Papilio machaon* L. Ik kan mededelen, dat ik deze soort zeker in 4 à 5 jaar niet meer heb waargenomen. Mijn laatste exemplaar, dat ik kweekte, dateert uit 1953. En dat was er dan nog maar één!

Toen ik daarna het plan opvatte een flinke partij rupsen te kweken, was er geen enkele meer te vinden en dat is tot op heden zo gebleven. Ik woon betrekkelijk dicht bij landerijen, waar wortelen in overvloed verbouwd worden, dus aan gebrek aan de voedselplant kan het niet liggen. Er moeten stellig andere factoren in het spel zijn.

W. OORD, Potterstraat 16, Deventer.