

Vorraden

In een partij van 625 balen gepelde grondnoten uit Egypte troffen wij de volgende insecten aan:

Carpophilus dimidiatus F.

Tenebrioides mauretanicus L.

Tribolium ferrugineum F.

Deze kevertjes komen in allerlei voorraden voor. Vooral in eiwit- en vetrijke droge plantaardige goederen, zoals noten en grondnoten vindt men deze insecten regelmatig. Het is zeer waarschijnlijk dat de grondnoten vóór de verlading besmet waren.

*Wilg*

Een rij wilgen langs de Blokdijk te Blokker (N.H.) was zó zwaar aangetast door spinselmotten (*Yponomeuta rorella* Hb.*) dat de bomen door hun kaalheid een winters uiterlijk hadden. Stam en takken waren geheel bedekt met het zilverachtig spinsel.

Door *Yponomeuta rorella* Hb. aangetaste wilg te Blokker.

*) determinatie van de heer J. H. KUCHLEIN te Amsterdam.

Stichel, W., *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II, Europa*. De Bibliotheek ontving vol. 3, heft 7 en 8 en vol. 4, heft 12 en 13. Hiermee is vol. 3 gevorderd tot *Saldula* en vol. 4 tot *Nariscus*. Het wekt steeds weer onze bewondering, dat dit belangrijke werk zo regelmatig verschijnt. — KR.

Het fourageren van parasieten van bladwespen. Ik nam het opnemen van honingdauw door parasieten van *Diprion* waar. Ze zwermde op grote schaal door de ondergroei van een dennenbos na een plaag van de dennenbladwesp. Ik zag, dat ze de honingdauw tot zich namen.

De betekenis van de ondergroei als producent van honingdauw wordt door verschillende schrijvers genoemd. Het is echter niet met zekerheid te zeggen, dat dit voedsel voor de rijping van de eieren beslist noodzakelijk is.

J. KLEINHOUT Jr., Sinthenstraat 44, Deventer.