

Darmafluiting veroorzaakt door het eten van kevers

door

P. KUYTEN

Professor Dr. L. D. EERLAND, chirurg te Groningen, vroeger te Parea in Oost-Java, vertelde mij het volgende interessante verhaal uit zijn Javaanse tijd.

Als ijverig verzamelaar had professor EERLAND verscheidene mensen uit de omgeving verzocht voor hem kevers te vangen. Tijdens avondlijke bezoeken aan dessa's in de bedoelde streek zag hij de hele bevolking bezig, bij het licht van toortsen insecten te zoeken. Hij was bij voorbaat al verheugd over de kevers, die men daar zo behulpzaam voor hem aan het vangen was.

Het bleek echter, dat men op jacht was naar grote „meikevers” (*Lepidiota* spec., waarschijnlijk *stigma* Fabr., Col., Scarabaeidae), die in lange bamboekokers bij tientallen verzameld werden. Als men voldoende kevers bij elkaar had, ging men ze boven een vuurtje roosteren, waarna men de „meikever-goreng” met smaak consumeerde.

In dezelfde periode, waarin deze avondlijke kevervangsten vielen, kwamen in het ziekenhuis uit de omtrek verscheidene patiënten met darmafluitingen binnen. Bij operatie bleek de afsluiting in de dunne darm veroorzaakt te zijn door dikke ballen van 2 tot 4 centimeter doorsnee, bestaande uit stukjes insectenskelet, die kennelijk van *Lepidiota* afkomstig waren. De samenhang tussen het geziene in de dessa's en deze ziekteverschijnselen was duidelijk. Zoals in ons land het overvloedig gebruik en slecht kauwen van rauwe peentjes vooral bij kinderen een worteltjes-ileus (= darmafluiting) kan veroorzaken, werd in de vermelde gevallen een *Lepidiota*-ileus veroorzaakt door het zich ophopen van grote hoeveelheden onverteerbare chitineuze resten van de geconsumeerde kevers.

Ook in West-Europa kwam het eten van meikevers in oude tijden wel voor. Zo geeft CALWER's Käferbuch zelfs een recept, afkomstig van een dame uit Duitsland. Bij de vermelde bereidingswijze was het ontstaan van darmafluitingen echter niet mogelijk. In een bepaald stadium van de bereiding moest de lekkernij namelijk gezeefd worden.

Summary

The author mentions some cases of *Lepidiota*-ileus in Eastern-Java, Indonesia, as told to him by Professor EERLAND, surgeon at Groningen, formerly in Eastern-Java. The patients had eaten large quantities of roasted beetles (*Lepidiota*, Scarabaeidae), whose indigestible, chitinous remains accumulated in several places inside the gut and caused a total constipation, that had to be cured by operation.

Groningen, Korreweg 328.

Achlya flavicornis L. in het Amsterdamse Bos (Lep., Thyatiridae). Op 18 maart 1960 ving de heer K. A. STRAATMAN op het verlichte raam van zijn woning op het kampeerterrein van het Amsterdamse Bos een prachtig gaaf exemplaar van *flavicornis*. Dit is een bevestiging van de reeds in Suppl. VII van de Catalogus vermelde vangst door de heer PEERDEMAN. We hoeven er niet meer aan te twifelen, dat deze mooie voorjaarsvlinder een vaste bewoner van het bos is. — LPK.