

Bevingingen omtrent drie bedreigde dagvlindersoorten in Zuid-Limburg

door

M. DELNOYE

1. *Spialia sertorius* Hoffmanssegg. Waarschijnlijk de enige vliegplaats van betekenis hier te lande is Bemelen met als voornaamste vindplaats de Bemelerberg. Hier was de vlinder in 1951 en 1952 nog tamelijk gewoon, maar in 1953 en 1954 vloog hij er reeds in veel geringer aantal. Sinds 1956 heb ik er geen enkel exemplaar meer gezien. Hoewel ik geen zekere oorzaken voor het verdwijnen heb kunnen vaststellen, geloof ik toch wel, dat dit te wijten is aan de te koude en te natte jaren. Het dier is nl. zeer warmteminnend. Op de vliegplaatsen is het alleen te vinden op de warmste plekjes. Om die op te sporen, hoeft men maar naar de krekels te luisteren. Die zitten altijd op de heetste plaatsen, liefst in uithollingen van het terrein.

2. *Cupido minimus* Fuessly. Een soort, die sterk gebonden is aan de voedselplant (*Anthyllis vulneraria* L., Wondklaver). Hoewel ook enkele andere klaversoorten als voedselplant worden opgegeven, heb ik in het buitenland *minimus* steeds aangetroffen op zeer droge plekjes, waarop altijd veel Wondklaver groeide. Daar *minimus* in tegenstelling tot bijv. *Cyaniris semiargus* von Rottemburg op de vliegplaatsen steeds veel vliegt, is het niet moeilijk zulke plekken te vinden. Tot nu toe heb ik in Nederland alleen te Schin op Geul zo'n kolonie aangetroffen. Hier vloog de vlinder van 1947 tot 1953 in twee generaties. Het terreintje, dat slechts met een honderd vierkante meter Wondklaver begroeid was, is in de zomer van 1953 afgebrand en sindsdien heb ik geen enkele *minimus* daar meer gevonden. Ik zoek nog steeds naar een geschikte plek om er Belgische dieren over te planten, wat naar mijn mening heel goed mogelijk is als de voedselplant er maar staat. Ik vrees, dat de soort op het ogenblik helaas niet meer inheems is.

3. *Strymonidia w. album* Knoch. Een soort, die door het verdwijnen van de iepebomen met de ondergang bedreigd wordt. Volgens mijn waarnemingen in de jaren 1952 tot 1958 is de vlinder alleen aan te treffen bij oude iepebomen. Op de var. *suberosa* en op jonge iepen zijn de rupsen niet te vinden, wel op wortelopslag van oude bomen. Ik heb *w. album* alleen gevonden te Valkenburg, maar ik geloof, dat er in Limburg nog wel meer groepen oude iepen te vinden zijn, die de soort herbergen. Men moet echter zoeken naar de volwassen rupsen of nog beter naar de poppen, die makkelijk te vinden zijn. De vlinder zelf is daarentegen moeilijker waar te nemen. Hij vliegt weinig en zit meestal onder of in de buurt van iepen gewoon in het stof, waarbij hij graag omvalt, alsof hij niet op zijn pootjes kan zitten. Van de drie genoemde soorten lijkt mij de laatste er nog het beste voor te staan.

Summary

Remarks on three species of Butterflies, in the Netherlands only to be found in the south of Dutch Limburg. The two species mentioned first have not been found back by the writer since 1956 (*Spialia sertorius*) and 1953 (*Cupido minimus*).

Sittard, Molenbeekstraat 3.