

the Netherlands, half of them are caused by the cuckoo-spit, *Philaenus spumarius*.

In the introduction the question is discussed whether those morphological alterations may be called galls which are caused by growth-substances, such as used for destroying weeds and besides those virescences of flowers and those witches' brooms which develop on plants infected by viruses.

The author arrives at the conclusion that these alterations may not be classified as galls.

#### Literatuur

- Bos, L., 1957a, Heksenbezemverschijnselen. Een pathologisch-morphologisch onderzoek. *Mededel. Landbouwhogeschool*, Wageningen, 57 : 1.
- , 1957b, Plant teratology and plant pathology. *Tijdschr. v. Plantenziekten* 63 : 222.
- DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M., 1957, Het Gallenboek, 2de druk, Zutphen.
- , 1958, Gallen gevormd door de schuimcikade, *Philaenus spumarius* (Fall.). *Tijdschr. v. Plantenziekten* 64 : 111.
- , 1959, Een zeldzame (?) mijtgal op de bladeren van de appel. *Ent. Ber.* 19: 14.
- DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M. & J. M. DEKHUIJZEN-MAASLAND, 1958, The bigamic generations of *Andricus corruptrix* Schlechtendal and *Andricus ligicolus* Hartig. *Tijdschr. v. Ent.* 101 : 101.
- FOCKEU, H., 1890, Galles observées dans le Nord de la France. *Rev. Bot. Nord d. France* 3 : 38.
- NIJVELDT, W., 1957, Nieuwe galmuggen voor de Nederlandse fauna (I). *Ent. Ber.* 17 : 77.
- OOSTSTROOM, S. J. VAN, 1958, De vruchtgal van *Gymnetron villosulum* Gyll. op *Veronica*. *Ent. Ber.* 18 : 107.
- OOSTSTROOM, S. J. VAN & Th. J. REICHGELT, 1958, De vruchtgal op *Veronica catenata* Pennell. *Correspondentieblad*, Leiden, no. 10 : 81.
- PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST, Wageningen, 1956, *Jaarboek 1955*; 1957, *Jaarboek 1956 en 1958*, *Jaarboek 1957*.
- VISSER, A. DE, 1958, *Petroselinum segetum* (L.) Koch in de Zwarte Polder. *Correspondentieblad*, Leiden, no. 10 : 105 en no. 11 : 124.

*Agrotis ypsilon* Hufn. Drie jaar hebben we door middel van het trekvlinderonderzoek nu wat meer aandacht aan deze soort kunnen besteden en het blijkt, dat dit beslist de moeite waard is. Dat *ypsilon* een trekker is, staat vast. Maar dat de zaak zo eenvoudig is als bij de *Atalanta* en de Oranje Lucernevlinder, geloof ik niet. Als in zoveel gevallen blijkt ook deze soort een speciale studie meer dan waard. In afwachting van een enthousiast lepidopteroloog, die deze taak op zich neemt, moeten we in elk geval zoveel mogelijk gegevens bijeen zien te brengen. Op de nieuwe druk van de trekvlinderkaarten komt ook *ypsilon* voor, zodat de kans, dat de soort vergeten wordt, veel kleiner is. Geef bij de vangsten van juli en vroeger vooral aan, in welke toestand de dieren verkeerden wat hun uiterlijk betreft. — LPK.

**Te koop.** Boeken (grotendeels over Rhopalocera) uit de nalatenschap van Prof. Dr. L. J. TOXOPEUS. Lijst met titels en prijzen ter inzage op de Bibliotheek.

*Cosymbia porata* L. (Lep., Geom.). Op 26 juli 1957 ving ik te Odoorn een licht okergeel ♂ van deze soort. Het was vrijwel ongetekend, slechts vage aanduidingen van de normale *porata*-tekening waren te zien. Ik wist er dan ook geen raad mee, maar de heer LEMPKE determineerde het als f. *flava* Bretschneider, die nog niet eerder uit ons land vermeld was.

M. P. PEERDEMAN, Westlandgracht 175II, Amsterdam-W.