

Cinxia borealis Fallen. Oisterwijk (Campina), 1 ♂ 23.VIII.1957, 1 ♂ 24.VII.1957; Bilthoven 2 ♂ ♂ en 1 ♀ 23.VIII.1957, 1 ♂ 25.VIII.1958, 1 ♂ 28.VIII.1958; Baarn 1 ♀ 27.VIII.1958. Alle exemplaren vlogen op struikhei (*Calluna vulgaris* Salisb.).

Arctophila bombiformis (Fallen). Crapoel, 1 ♀ 11.VIII.1958. Van deze grote, sterk op een aardhommel gelijkende soort zijn uit Nederland slechts weinig exemplaren bekend. Het dier bevond zich op Wilde Marjolein (*Origanum vulgare* L.), die groeide langs de kant van een hol weggetje.

Arctophila mussitans (Fabricius). Pezaken (Z.-L.), 1 ♂ 15.VIII.1958. Deze eveneens dichtbehaarde soort heeft meer het uiterlijk van een moshommel. Ik trof het dier aan zonnend op een blad van een eikestruik.

Lampetia equestris (Fabricius). De Bilt, 2 ♂ ♂ (type), var. *narcissi* Fabr. 1 ♂ en 1 ♀, var. *validus* Meigen 1 ♀. Alle op 15.VII.1958.

De dieren vlogen rond in een tuin, waar veel bloembollen groeiden. Hun aanwezigheid is dus gemakkelijk te verklaren. De var. *validus*, geheel zwart met een geelachtige achterlijfspunt, schijnt veel minder voor te komen dan het type.

Tubifera hybrida Loew. Oisterwijk (Campina), 1 ♀ 23.VII.1957, De Bilt, 1 ♂ 5.VIII.1957, 1 ♂ 1.VI.1958. Het laatstgenoemde exemplaar hield zich op de bloemschermen van een meidoorn (*Crataegus oxyacantha* L.) op.

Eurinomomyia transfuga (Linnaeus). Oisterwijk (Campina), 1 ♀ 23.VII.1957, Katwijk aan Zee, 1 ♀ 15.V.1958; De Bilt, 1 ♂ 31.V.1958. Het exemplaar uit De Bilt werd niet, zoals de overige, langs een sloot aangetroffen, maar in een bloemperk.

Zelima nemorum Fabricius. Pezaken (Z.-L.), 1 ♀ 18.VIII.1958. Het dier liep rond over de bladeren van braam.

Penthesilia berberina Fabricius. De Bilt, 1 ♂ 1.VI.1958. Ik ving dit exemplaar, terwijl het rondvlog in een haag van Meidoorn en Lijsterbes (*Sorbus aucuparia* L.), langs een zandpad. Er kan dus niet gesproken worden van een echt bos, waarin *P. berberina* uitsluitend zou voorkomen.

Eumerus tuberculatus Rondani. De Bilt, 3 ♂ ♂ 15.VII.1958. Deze dieren werden gevangen in dezelfde tuin als *L. equestris*.

Summary

A survey is given of some interesting Syrphidae caught in different districts of the country. Especially *Sphaerophoria rueppellii*, *Syrphus annulatus*, *Chrysogaster splendens*, *Arctophila bombiformis*, and *A. mussitans* are rare in the Netherlands. Rotterdam-C., de Graeffstraat 9 A.

Carcharodus alcaeae Esper. Het is al weer afgelopen met de goede tijd van deze Hesperide, althans wat onze fauna betreft. Een van de beste vindplaatsen was die aan het Juliana-kanaal bij Stein. Al een paar jaar ontbreekt de soort daar volkomen. Op de trekvlinderkaart voor 1958 noteerde Pater A. MUNSTERS: „Noch vlinder, noch rups gezien, ook geen sporen ervan op de bloemen van de *Malva*”.

Er is geen sprake van, dat de periode van bloei, die voor veel soorten omstreeks 1930 inzette, voor al deze dieren zonder onderbreking voortduurt! Het is dan ook zeker geen eenvoudig probleem achter de oorzaken van deze schommelingen te komen. — LPK.