

Probably *N. menoeti* *menoeti* is widely spread throughout Borneo, although it has up to now been taken in the extreme N. and in the S. E. only. The territory occupied by *N. menoeti* *adpersus* is likely to be no more than a relatively small enclave in this large area.

Mr. A. M. R. WEGNER, director of the Museum Zoologicum at Bogor, sent the specimens for identification and procured the necessary information about the exact situation of the localities noted on the labels. His kind help is gratefully acknowledged here.

Onderzoek zeldzame insectensoorten door het R.I.V.O.N. De Natuurbeschermingscommissie der N.E.V. verzoekt alle leden, die inlichtingen kunnen geven omtrent de vindplaatsen van hierna te noemen zeldzame Lepidoptera, dit aan onze Commissie te willen melden. De bedoeling van het R.I.V.O.N. is, om te controleren of en in hoeverre deze terreinen nog intact zijn en zo ja, of de soort er dan nog voorkomt.

Volgende soorten uit de Catalogus LEMPKE komen in aanmerking:

<i>Thersamonia dispar</i> Hw.	<i>Argynnis paphia</i> L.
<i>Palaeochrysophanus hippothoë</i> L.	<i>Nymphalis polychloros</i> L.
<i>Maculinea teleius</i> Bergstr.	<i>Coenonympha bero</i> L.
<i>Maculineaalcon</i> Schiff.	<i>Hipparchia stalinus</i> Hfn.
<i>Lycaeides idas</i> L.	<i>Rhyparia purpurata</i> L.
<i>Vacciniina optilete</i> Knoch	<i>Graptolitha lamda</i> F.
<i>Strymonidia w. album</i> Knoch	<i>Dicycla oo</i> L.
<i>Strymonidia pruni</i> L.	<i>Cosmia diffinis</i> L.
<i>Apatura ilia</i> Schiff.	<i>Hydraecia lucens</i> Frr.
<i>Limenitis populi</i> L.	<i>Hydraecia petasitis</i> Doubld.
<i>Euphydryas aurinia</i> v. Rott.	<i>Alcis jubata</i> Thunb.
<i>Boloria sifanica</i> Gr. Grzh.	<i>Fagivorina arenaria</i> Hufn.
<i>Clossiana euphrosyne</i> L.	<i>Synopsisia sociaria</i> Hb.
<i>Fabriciana adippe</i> Schiff.	

Tevens staan ook het vliegend hert (*Lucanus cervus*) en de Satermier (*Formica exsecta*) in de volle aandacht.

De Natuurbeschermingscommissie der N.E.V. zal gaarne zo uitvoerig mogelijke mededelingen omtrent bovenstaande soorten ontvangen, zodat zij die aan het R.I.V.O.N. zal kunnen doorgeven.

Brieven te zenden aan: De secretaris van de Natuurbeschermingscommissie W. H. GRAVESTIJN, Rubensstraat 87, Amsterdam-Z. 2.

Het succes van rupsen zoeken. Op 20 april 1958 verzamelden mijn vrouw en ik 's nachts met de oppomplamp een flink aantal rupsen van uilen op een heideveld, dat ook sterk begroeid was met grassen, in de omgeving van Kootwijk. Over het algemeen zijn deze dieren moeilijk of in het geheel niet met de boeken te determineren, zodat het altijd een verrassing blijft, wat er later uit te voorschijn zal komen. Het resultaat was in dit geval bepaald zeer aanmoedigend, want ongeveer vier maanden later verschenen de volgende vlindersoorten uit de verkregen poppen:

Amathea castanea Esper op 15 augustus,

Amathea agathina Duponchel op 18 augustus,

Paradiarsia glareosa Esper, de mooiste vondst van alle, op 24 augustus.

W. H. SOUTENDIJK, Wiessel.

Stichel, W., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II, Europa. Verschenen is vol. 3, Heft 4, omvattende de genera *Empicorella* tot *Rhinocoris*. — KR.