

Third longitudinal vein with an oblique appendix protruding into the sub-apical cell. Squamae and halteres white.

Holotype male: Ifar (near Hollandia), Dutch New Guinea, Dec. 1957, G. DEN HOED coll.

The type-specimens of the described species are in the collection of the author. Baarn, Cantonlaan 1.

Eugraphe subrosea Stephens, nieuw voor de Nederlandse fauna

door

P. H. VAN DE POL



Eugraphe subrosea Steph. Boven: ♂ Noordlaren (prov. Groningen), 19.VIII.1958. Onder: ♀ Lechts (Estland), f. *subcaerulea* Stgr.

In het gevangen materiaal, afkomstig uit een in Noordlaren (prov. Groningen) opgestelde vanglamp, bevond zich verleden jaar een Agrotide, die ik niet bij een mij bekende soort kon onderbrengen. De heer LEMPKE aan wie ik het tamelijk afgevlogen dier deed toekomen, vermoedde dat sprake was van *Eugraphe subrosea* Steph., welk vermoeden bevestigd werd door de determinatie van de heer WARNECKE te Hamburg. Beide heren dank ik hierbij voor de gedane moeite.

In de literatuur vermeldt WARNECKE met betrekking tot deze soort het volgende: In 1923 is *E. subrosea* in Noord-Duitsland ontdekt. Sindsdien is gebleken, dat het dier in de meeste venen aldaar voorkomt en in sommige jaren zelfs niet zeldzaam is. De vlinders vliegen vanaf midden juli. De hoofdvliegtijd valt in augustus. De rupsen zijn tamelijk polyfaag en leven o.a. op struik- en lavendelheide.

Naarmate meer materiaal van deze soort was verzameld, bleek dat zij sterk variabel was. De in Engeland beschreven nominaatvorm is zwak roodbruin van kleur. In Noord-Duitsland blijkt deze vorm eveneens voor te komen. Daarnaast worden aldaar ook gevangen o.a. overgangsvormen tussen de roodbruine nominaatvorm en de in Rusland voorkomende grijsblauwe vorm *subcaerulea* Stgr. Het blijkt, dat in Oost-Azië en Rusland met inbegrip van de vroegere Baltische landen uitsluitend deze en niet de nominaatvorm aanwezig is. In Zweden daarentegen komen behalve *subcaerulea* ook de nominaatvorm en overgangsvormen voor.

Uit het voorgaande blijkt een interessante geografische variabiliteit; de kleur van de soort wordt van west naar oost steeds meer grijsblauw.

Het op 19.VIII.1958 in Noordlaren gevangen dier is te afgevlogen om met zekerheid te kunnen vaststellen tot welke vorm het behoort. Waarschijnlijk is sprake van een overgangsvorm tussen de Engelse nominaatvorm en de grijsblauwe Oosteuropese *subcaerulea*. Dit is in overeenstemming met hetgeen is vermeld over

de dieren, die in het aangrenzende Duitse gebied worden gevangen en die, althans voor een deel, eveneens tot deze overgangsvorm behoren.

De geografische verbreiding en de levenswijze van deze soort in aanmerking genomen, is het niet onmogelijk, dat zij op meer plaatsen in het noorden van ons land voorkomt.

Summary

On August 19th 1958 the first Dutch specimen of *Eugraphe subrosea* Stephens was taken at Noordlaren, prov. of Groningen. It is rather worn so that it is not possible to determine the colour form with certainty, but probably it is intermediate between the reddish nominate form and the f. *subcaerulea* from eastern Europe.

Literatuur

- WARNECKE, G., 1926, *Agrotis subrosea* Steph. auf dem europäischen Festland, *Ent. Zeitschr. Frankfurt* 40: 173—189.
 —————, 1930, Die Groszschmetterlinge der Umgebung von Hamburg-Altona. *Verhandl. Ver. f. naturw. Heimatforsch. zu Hbg.* 22: 137—140.

Bennekom, Hullenberglaan 7.

Het ongewenste als opgave. Uitgave: Service, Den Haag.

„Soms moeten wij stilstaan. De tekenen van uiterlijke voortbeweging dienen wij prijs te geven, ongeacht de glimlach van medelijden of de verbaasde blikken die ons bereiken van hen die het woord paardekracht slechts als P.K. durven kennen. Te gemakkelijk immers vergeten wij dat dit stilstaan, dat tientallen guldens per uur kost volgens de maatstaf der economen, dat deze kostbare stilstand geen luxe is, maar basis”.

Met deze woorden begint de psychiater FENTENER VAN VLISSINGEN de eerste bijdrage in de bundel „Het ongewenste als opgave”. Met hem schrijven A. DE FROE, J. KOK, P. A. VAN DER LAAN en M. PICARD hun deel in dit voortreffelijke boekje, dat uit christelijke overtuiging samengesteld, voor iedereen een waardevolle bijdrage kan zijn voor de vorming van zijn oordeel over de wereld waarin wij, hier en nu, leven. De waarschuwing die hierboven geciteerd wordt, geldt voor iedereen, welke ook zijn werkkring is, waarheen ook zijn belangstelling gaat, wat ook hem ter harte gaat.

Het deel van VAN DER LAAN heet „Twee benaderingswijzen, ook bij de insektenbestrijding”. Hierin wordt gesproken over het probleem van de insektenplagen in de landbouw en de betekenis van insekten als overbrengers van ziekten, terwijl een heldere uiteenzetting wordt gegeven van de tegenstelling tussen technische en biologische insektenbestrijding.

Het is een goed geschreven stuk, dat door elke entomoloog met vrucht gelezen kan worden. Maar de grote betekenis krijgt dit stuk in het verband van het geheel. Daarmee wordt het probleem, dat de bioloog belangrijk vindt, in zijn juiste verhouding tot andere problemen weergegeven, en de grote betekenis van dit aspect der menselijke activiteit voor de mens als totaliteit in het licht gesteld.

Wij mogen dankbaar zijn dat dit stuk van VAN DER LAAN op deze plaats is gepubliceerd. Hij en de andere auteurs hebben met de samenstelling van dit boekje een belangrijk werk verricht. — D. J. KUENEN.
