

Summary

The year 1957 was very bad for lepidopterologists; the numbers of captured species and the number of observed specimens per species have been lower than in many foregoing years. The author gives an enumeration of interesting specimens and capturing dates.

Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22.

Hydraecia petasitis Dbld. reeds in 1946 in Nederland gevangen

door

G. F. WILMINK

Bij het lezen van de mededeling van W. J. BOER LEFFEF in *Ent. Ber.* 16 (1956): 18 over de vangst van het eerste Nederlandse exemplaar van *H. petasitis* Dbld. herinnerde ik mij, dat zich onder de exemplaren van *H. micacea* Esp. in mijn collectie ook een ex. bevond, dat door zijn forsere bouw en donkere kleur zich onderscheidde van de andere. Het dier ving ik te Goes op 4.VIII.1946 op licht.

Er bestond bij mij al lang twijfel of dit wel een *micacea* zou zijn. Daar ik geen vergelijkingsmateriaal bezat, bleef het echter daarbij, tot ik de afbeelding in bovengenoemde publicatie zag. Alle twijfel werd weggenomen, toen de heer BOER LEFFEF verleden jaar tijdens een bezoek aan Groningen de vlinder kon bekijken. Hij bevestigde mij, dat mijn dier zonder twijfel een *petasitis* was.

Het eerste Nederlandse exemplaar van deze soort werd dus reeds in 1946 door mij te Goes (Zld.) gevangen.

Summary

The first Dutch *Hydraecia petasitis* Dbld. was taken at Goes (prov. of Sealand) on 4.VIII.1946.

Groningen, Gorechtkade 99B.

Opmerkingen over Nederlandse Macrolepidoptera

door

M. W. CAMPING

Onderstaand geef ik een overzicht van de vlinders, welke door mij tijdens de 90e Wintervergadering werden besproken:

I. Enkele minder algemene en zeldzame soorten uit het moerasgebied van midden-Friesland. Deze zijn grotendeels reeds vermeld in *Ent. Ber.* 15 : 192 (1954) en 426 (1955).

Nieuwe ontdekkingen in dit gebied zijn de volgende:

- a. *Schrankia costaestrigalis* Sph., komt door het gehele land verspreid op vochtige plaatsen voor.
- b. *Tholomiges turfosalis* Wocke, was tot nog toe hoofdzakelijk bekend van het veen bij de St. Jansberg bij Plasmolen en uit de Kortenhoeftse plassen.

c. *Coenotephria sagittata* F. Naar deze soort, waarvan de rups uitsluitend leeft van de zaadtrossen van poelruit, *Tbalictrum flavum* L., had ik al jaren tevergeefs gezocht. In 1956 vond ik bij toeval een enige mm groot rupsje. Een handvol meegenomen zaadtrossen bleek later ongeveer 250 rupsjes te bevatten! De soort is erg lokaal, is trouwens in geheel Noord- en West-Europa een zeldzaamheid, en was tot nog toe niet uit het noorden van ons land bekend.

2. Twee afwijkende vormen van dagvlinders, t.w.:

a. *Aporia crataegi* L., f. *suffusa* Tutt, waarbij de zwarte beschubbing zich over een groot deel van de vleugels heeft uitgebreid.

b. *Fabriciana niobe* L., f. *pelopia* Borkh. Gezien de grote zeldzaamheid is dit waarschijnlijk een recessieve vorm.

3. Twee zeldzaamheden uit de duinen, nl.:

a. *Sphacia crabroniformis* Lewin, een zeer lokale soort.

b. *Scopula emutaria* Hb., een spannertje, dat hier en daar in de duinen voorkomt.

4. Enkele *Heliothis*-soorten, nl.:

a. *peltigera* Schiff., gevangen op Vlieland.

b. *obsoleta* F. (*armigera* Hb.), gekweekt uit een rups, gevonden bij Leeuwarden op tomaat. Deze soorten heten erg op elkaar te gelijken. Met de meeste dieren, die hier worden gevangen en die hier uiteraard nogal afgevlogen arriveren, zal dit inderdaad wel het geval zijn. Tussen deze afgevlogen *peltigera* en gekweekte *obsoleta* is het verschil echter wel erg groot.

c. *dipsacea* L., één soort, die in de duinen vrij geregeld voorkomt.

d. *maritima* De Grasl., in de heidestroken in het Z.O. van ons land een geregelde verschijning, echter pas de laatste jaren ook uit de duinen bekend.

5. Enkele Macro-Psychiden.

a. *Acantopsyche atra* L. (*opacella* H.S.), tot nog toe zeer sporadisch in een enkel ex. uit ons land vermeld. In 1949 vond ik enkele ledige zakken tussen Norg en Roden. Pas in 1954 gelukte het mij een aantal „bewoonde” zakken, waaronder enkele ♂♂, te verzamelen. Van deze heb ik de soort ab ovo gekweekt.

b. *Phalacropteryx graslinella* Bsd., een zeer lokale soort, die in het N. misschien wat meer voorkomt dan in de rest van het land. Kenmerkend voor deze soort is de overdwarse bevestiging van het voor de zak gebruikte materiaal. Tevens wordt algemeen als kenmerk voor de rups opgegeven, dat de zak dicht bedekt is met wollig spinsel. Dit geldt naar mijn ervaring echter alleen, nadat de rups de zak ter verpoping heeft vastgesponnen. Zakken, waarin zich nog rupsen bevinden, zijn nl. niet met spinsel bedekt.

6. Een serie exemplaren van *Hydraecia lucens* Frr., een tot nog toe lokale soort, die echter in het Fochteler Veer (hoogveen!) een zeer gewone verschijning is op de lamp en op bloeiende *Molinia coerulea* Moench. Ook in de „Oude Venen” (laagveen) werd één exemplaar gevangen.

Summary

Discussion of various species of Macrolepidoptera which are of interest to the Netherlands fauna.

Leeuwarden, Robert Kochstraat 25.