

De mannelijke genitalia zijn uiterst karakteristiek en herkenbaar aan een knotsvormige, grote aedocagus. Zij zijn zeer duidelijk afgebeeld door PIERCE (Gen. Brit. Tortr., 1922, plaat 11; de vier onderste figuren beelden *alternana* en *straminea* naast elkaar af). De soorten zijn uiterlijk zeer gelijk, *alternana* is iets bleker, met minder duidelijke tekening, vooral met minder duidelijk schuin submediaan streepje, dat op de binnenrand rust. Een vergelijking van lange series van verse exemplaren zou mogelijk bruikbaar uitwendige verschillen ter onderscheiding van de twee soorten opleveren, vooralsnog is het alleen door een onderzoek van de genitalia mogelijk, *alternana* met zekerheid te herkennen.

Ik heb al het materiaal van *straminea* in de Musea van Leiden en Amsterdam onderzocht, doch daarbij slechts twee mannetjes van *alternana* aangetroffen, nl. in de collectie HEYLAERTS, afkomstig uit Breda, „Loopsch.“, op 27.V. en 29.VII. 1882 verzameld. „Loopsch.“ is een afkorting van Loopschans, zie *Tijdschr. Entom.* 16: 146, regel 17 van onderen.

Summary

When examining the genitalia of a number of „*Euxanthis*“ *straminea* Hw., two specimens of „*Eux.*“ *alternana* Steph. were found, collected by HEYLAERTS in the neighbourhood of Breda in 1882. The species was not recorded from the Netherlands before.

Epirrhoë tristata L. Op 10 mei 1957 ving ik in de Middachter bossen een exemplaar van *Ep. tristata*. Op 19 mei 1958 vloog de soort er niet zeldzaam op plaatsen in dennenbossen met ondergroei van Walstro (*Galium silvaticum* L.).

H. G. VAN GALEN, Haartsestraat, Aalten.

Pararge aegeria L., f. *antico-excessa* Lempke. Exemplaren van het Bonte Zandoogje met extra oog en op de bovenzijde der voorvleugels zijn zeldzaam. In het laatste supplement van de Catalogus kon ik er maar vier vermelden.



Foto Picolor, Nijmegen

Bij het doorkijken van de collectie van de heer N. C. VAN DER VUET te Nijmegen zag ik een prachtig exemplaar met een extra oog vlak onder het normale, gevangen op 3 mei 1953 te Bergen Dal. Ik kreeg er later een uitstekende foto van toegezonden, die hierbij afgedrukt wordt. Het extra oogje is wat kleiner dan het normale. In de lichte vlek boven het oog staat bovendien nog een minuscuul puntje als eerste aanduiding van een derde apicale oogvlek, maar dit is alleen op de oorspronkelijke vergrote foto goed te zien. — LPK.
