

mens, bv. aan gewonden, die tijdens een oorlog niet direct werden opgehaald. De buitentemperatuur is van invloed. De aantastingen treden bij warmte meer op dan bij koude. In het hierboven beschreven geval kan ook worden aangenomen, dat de hete dagen in het begin van juli de ontwikkeling gunstig hebben beïnvloed.

Summary

Lucilia sericata using man as host. An old man proved to have larvae of this species in open wounds. After rearing the imagines could be determined.

Nijmegen, Marie Curiestraat 6.

Lorenz, H., u. M. Kraus, Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodontoidea). (Abhandlungen zur Larvalsystematik der Insekten, nr. 1). Berlin, 1957, Akademie-Verlag. D.M. 38.—

Het is gezien de steeds groeiende belangstelling voor de systematiek van larven, niet te verwonderen, dat de larven der bladwespen ook weer eens een beurt hebben gekregen. Het werd trouwens tijd, want na het bekende werk van BRISCHKE & ZADDACH (1862—1885!) was er geen samenvattend werk over de Europese bladwesplarven meer verschenen.

Het in 1922 gepubliceerde werk van YUASA heeft voornamelijk betrekking op Amerikaanse soorten, zodat wij voor Europa waren aangewezen op de vrij summere beschrijvingen in het overigens voortreffelijke werk van ENSLIN.

In deze leemte wordt nu, en naar reeds bij eerste kennismaking blijkt, op uitmuntende wijze, voorzien door het werk van LORENZ & KRAUS. Ik ben weliswaar nog niet in de gelegenheid geweest het werk op praktische bruikbaarheid te toetsen, maar het is bij een dergelijke gedegen bewerking niet aan te nemen, dat het in dit opzicht zou tegenvallen.

In een betrekkelijk korte periode (1951—1954) zijn de auteurs er in geslaagd larvenmateriaal van een zeer groot gedeelte der Middeneuropese bladwespen te verzamelen en te beschrijven, het laatste op ten dele originele wijze en toegelicht door vele uitstekende afbeeldingen.

De schrijvers volgen het systeem dat door ROSS en door BENSON is ontwikkeld en door laatstgenoemde wordt gebruikt in zijn bewerking van de Engelse Symphyta in de serie „Handbooks for the identification of British Insects”. Dit geldt uiteraard niet voor de Nematinen, die in deze uitgave nog ontbreken.

Het boek eindigt met een beschouwend hoofdstuk, waarin de door de larvenmorfologie gesuggereerde verwantschappen worden vergeleken met het systeem van BENSON. Op enkele uitzonderingen na blijkt een voortreffelijke overeenstemming te bestaan, met name daar waar BENSON oude en heterogene genera heeft onderverdeeld. Dat BENSON's samenvoeging van de Dolerinen met de Selandriinen geen steun vindt in de larvensystematiek, is zo'n uitzondering, die trouwens maar weinigen verwonderen zal. Alles bij elkaar een voortreffelijk en hoogst welkom werk. — G. BARENDRECHT.

De oppomplamp. Opgehangen voor een scherm of geplaatst op een op de grond liggend laken voldoet de vergasser mij minder dan wanneer ik er mee rond loop op een vangterrein en hem zo hier en daar neerzet. Zo maar gewoon op de grond, liefst op zand, niet op gras of tussen kruiden. Bij gebruik op de hei zet ik de lamp op een klein krukje, zodat het licht vrij over de hei uitstraalt. Geen laken of zo iets er bij.

Natuurlijk is het aantal aanvliegers niet zo groot als bij de M.L.-lamp of bij de hogedruk-kwiklamp en komen er percentsgewijze meer spanners dan uilen op. Op afgelegen terreinen echter, waar geen stroom te krijgen is, zijn de vergassers een uitkomst. Beide petromaxlampen, zowel de 350 als de 500 kaars, voldoen uitstekend. Geen gezeur meer van voorverwarmen met spiritus!

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.).