

- , 1932, in ULTRÉE, *Meded. Proefst. Malang* 82 : 17—20.
- CORPORAAL, J. B., 1920/1921, *Meded. Alg. Proefst. A.V.R.O.S.* 9 : 31, id. 13 : 22.
- EGGERS, H., 1922, *Entom. Berichten* 6 : 87.
- , 1923, *Zool. Meded. Leiden* 7 : 130.
- FLUITER, H. J. DE, 1939—1940, in *Jaarversl. 1938 v. h. Besoek. Proefst.*: 37, id. 1939 : 38, Viermandel. Versl. id., 1940, 1 : 12.
- FRANSSSEN, C. J. H. en TIGGLOVEND, L. M. J., 1935, *De Vijanden en de Ziekten der Orchideeën op Java en hunne bestrijding (Batavia)*: 38—41.
- GOOT, P. VAN DER, 1928, *Meded. Inst. v. Plantenziekten* 74.
- , 1934—1936, Id. 83, 84, 85, 87.
- , 1939—1940, *Ziekten en Plagen der Cultuurgewassen in Ned. Indië in 1937*, id. in 1938, id. in 1940 (roneogr.).
- GREENWOOD, 1930, *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*: 65.
- GREGORY, J. L., 1955, Rep. 6th Commonw. Entom. Conf. 1954: 294.
- HAGEDORN, M. 1912, *Ent. Blätter* 8 : 37.
- ISASCA, A. J. V., 1941, *De Bergcultures* 15 : 1367—1369.
- KALSHOVEN, L. G. E., 1925/1926, Versl. 6de Vergad. Vereen. Proefst. Pers.: 73, and *Tectona* 19 : 629.
- , 1926, *Meded. Inst. v. Plantenziekten* 69 : 61—66, 118—120.
- , 1951, *De Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesië II* : 850.
- , 1958, *Entom. Ber.* 18 : 147—160, 185—193.
- KLINKHAMER, J. P., 1925, *Alg. Landb. Weekbl. v. Ned. Indië* 9 : 1379.
- LEEFMANS, S., 1928, *De Bergcultures* 2 : 294.
- , 1929—1934, *Meded. Inst. v. Plantenziekten* 75, 79, 81, 82.
- ROEPKE, W., 1909, *Cultuurgids* 11 : 366.
- SCHEDL, K. E., 1942, *Tijds. v. Entom.* 85 : 4.
- ZIMMERMANN, A., 1899, *Teijsmannia* 9 : 43—44.
- , 1901, in: *Meded. 's Lands Plantentuin* 44 : 94—95.

Afdeling Zuid-Holland. In dit winterseizoen zal de afdeling nog vergaderen op 17 december en 18 maart in Hotel Terminus te Den Haag en op een nog nader vast te stellen datum in april in het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden.

I. A. KAIJADOE, Secretaris-penningmeester.

*Hadena confusa* Hufnagel. In aansluiting aan het berichtje van de heer BOER LEFFEF in *Ent. Ber.* 17 : (1957), kan ik meedelen, dat *confusa* ook hier te Raalte goed is gaan vliegen. Maar dit is wel plotseling gegaan. In 1953 ving ik de eerste exemplaren. Merkwaardig genoeg in 1954 echter geen enkele. Dan in 1955 weer enige en in 1956 zet deze stijgende lijn door, om bepaald een gewone verschijning op licht te worden in de maanden juni en juli 1957. Avonden met 10 à 15 stuks waren regel. Van een tweede generatie in augustus en september heb ik echter, in tegenstelling met Apeldoorn, niets vernomen.

G. J. FLINT, Roggestraat 1b, Raalte.

*Late Noctua pronuba* L. (Lep., Noctuidae). Toen we 3 oktober j.l. 's avonds vanuit het Concertgebouw naar huis wandelden, zag ik op de ruit van een verlichte etalage een tamelijk grote donkere uil zitten, te fors voor een gamma-uil. Tegen het felle licht in was niet duidelijk te onderscheiden welke soort het was, maar toen ik het dier op mijn vinger liet kruipen, bleek het een prachtig kersvers exemplaar van de Huismoeder te zijn van de vorm met bijna eenkleurige donkerbruinachtige voorvleugels.

De vlinder die nog maar kort uit de pop geweest kan zijn, kan natuurlijk onmogelijk afkomstig zijn van een overwinterde rups. Ik twijfel er niet aan, of dit moet een vertegenwoordiger geweest zijn van een zeker niet talrijk voorkomende partiële tweede generatie.

— LPK.